

CONSERVATION DES POUDRES APRÈS OUVERTURE

Le tableau ci-après reprend les principales poudres utilisées aux HUG en précisant la validité de conservation de ces produits une fois ouverts.

ATTENTION

La stabilité après ouverture de tous ces produits n'est valable que sous réserve de la validité de la date d'expiration !

Nom spécialité DCI	DUREE D'UTILISATION ET MODALITE DE CONSERVATION			
	Etat *	Durée (sous réserve date exp.)	Température	Particularités
Metamucil regular pdre orale 336g psyllium	Ouvert	12 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité
Resonium A pdre orale 454g colestyramine	Ouvert	3 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité
Pevaryl pdre 1% 30 g éconazole	Ouvert	12 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité
Talcum PhEur pdre 80g talc	Ouvert	12 mois Neonat : 2 mois	T° ambiante	Abri de l'humidité Ne pas utiliser dans l'incubateur

*Refermer après usage

Références : Données du fabricant Verfora / Document Pharmacie interhospitalière de la Côte « Durée et modalité de conservation de différents médicaments après ouverture », 06.2026 / Protocole « Retard de chute du cordon ombilical », Service des USI/Neonat, 2016 http://wiki.hcuge.ch/download/attachments/28082840/Retard%20chute%20cordon_270916.pdf?api=v2 / Base de données interne, Pharmacie des HUG