Département de l'enfant et de l'adolescent
Service des Soins Intensifs de
Pédiatrie et Néonatologie
Août 2026 naba/algn/ceft

Hôpitaux Universitaires Genève

PRODUITS STABLES EN SERINGUE PDT 48H QUELQUE SOIT LE POIDS DU PATIENT

Médicaments en perfusion IV continue, préparés en seringue selon la règle de calcul du service, stables pendant une durée de 48h.
Avantages : moins de risque hémodynamique, économie (coûts, épargne de produits difficilement obtenables sur le marché, écologie)

Conditions:

- Perfusion à travers un filtre en ligne 0,2 microns : ELD96 et NEO96
  En cas de problème avec un filtre en ligne, changer aussi la solution dans la seringue.
- Dilution avec le solvant indiqué (voir *Particularités* ci-après)
- Milrinone (ancien Corotrop) : valable seulement pour enfant ≥5kg. La solution n'est pas stable plus de 24h pour les enfants de <5kg aux concentrations utilisées dans le Service

Attention :

1. Bien que des données de stabilité existent, un risque de dégradation ne peut être exclu. **En cas d'effet thérapeutique insuffisant ou variable**, **penser à changer la seringue !**
2. Si la dilution se fait dans un **autre solvant** que celui indiqué sous *Particularités* (mais valide selon le guide des médicaments injectables Ped), **la stabilité max. est de 24h (changer la seringue aux 24h)**
3. **Changer la tubulure toutes les 48h au moment du changement de la seringue**

DCI	Nom de la spécialité	Particularités
Acide etacrinique	Reomax	Dilution avec NaCl 0,9%
ADREnaline		Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
DOBUtamine	Dobutrex	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
DOPAmine		Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
FENTanyl	Fentanyl, Sintenyl	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
HEPArine		Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
ISOPrénaline	Isuprel Isoprenaline CIVAS HUG	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9% Perfusion à l'abri de la lumière
Midazolam	Dormicum, Midazolam	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
MILRinone	Milrinon (ancien Corotrop)	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9% Si < 5kg, changement aux 24 heures
MORPhine		Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
Nitroglycérine	Perlinganit	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
Nitroprussiate de sodium	Nipruss	Dilution avec Glucose 5% Perfusion à l'abri de la lumière
NORAdrénaline		Dilution avec Glucose 5%
Pousse-Amines	NaCl 0.9%, G5%, G10%	-
Potassium chlorure	KCL	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%
Rocuronium	Esmeron	Dilution avec Glucose 5% ou NaCl 0,9%

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG. Seule la version la plus récente visible sur le site internet de la pharmacie des HUG fait foi (http://pharmacie.hug.ch)