

## Übersichtsschema für medizinische Kontrollen, Behandlungen und Wiederaufnahme der Aktivitäten

Zeit nach der Transplantation	0 bis 3 Monate	3 bis 18 Monate	ab 18 Monaten	2 Jahre	3 Jahre
Kontrolle beim Kinderarzt oder Gastroenterologen (mind.)	1 x pro Woche	1x/Monat bis 18 Monate nach Transplantation	Alle 3 Monate		
Kontrolle bei den HUG (mind.), Monate nach Transplantation	3	6, 9, 12, 18		24 Monate	jährliche Kontrolle

<b>Immunsuppressiva °</b>	Dosierung gemäss Protokoll, Behandlung je nach Situation		Lebenslange Behandlung		
<b>Prednisone ®</b>	Gemäss Schema				
<b>Nexium / oméprazole ®</b>	Mit Prednison		<i>Mehr bei Indikation</i>		
<b>Valcyte ®</b>	6 Monate		<i>Mehr bei Indikation</i>		
<b>Bactrim / Nopil ®</b>	1 Jahr				
<b>Aspirine ®</b>	3 Monate		<i>Mehr bei chirurgischer Indikation</i>		
<b>Ursofalk ®</b>	1 Jahr		<i>Mehr bei Indikation</i>		
<b>Andere Behandlungen</b>	Amlodipin, Spironolacton, Clexane oder Xarelto, Vitamine, Eisen, Magnesium, Kalzium sowie alle weiteren Behandlungen werden je nach Bedarf verschrieben				

° Tacrolimus, everolimus, MMF, ciclosporine

	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	< 1 Jahr
<b>Kinderkrippe</b>		* 1			
<b>Schule</b>	* 1				
<b>Sport</b>	* 2	Ohne Einschränkungen (ausser Schwimmbad)			
<b>Meer, privater Pool</b>					
<b>Öffentliches Schwimmbad, Spa/Wellness, See oder Fluss</b>					

\* 1 Je nach Situation

\* 2 Aktivität auf Gehen während 6 Wochen beschränkt, danach schrittweise Wiederaufnahme des Sports bis 3 Monate – Kontaktsportarten und Trampolin ausgeschlossen

