


1ère journée de formation continue HegeBe

La prescription médicalisée d'héroïne : le début d'un changement ?

Etre en manque de prescription d'héroïne

- L'ARUE, Association pour la Reconnaissance des Usagers Emergents, Lausanne
- Dr I. Gothuey, UAS, Fondation Nant
- Dr M. Monnat, CSM, DP-CHUV
- N. Pythoud, Le Passage, Fondation ABS

Contexte



Conseil Consultatif pour la prévention et la lutte contre la toxico dépendance

- Réunion initiée par le Conseiller d'état en été 2006.
- 2 Objets au travail,
 - Opportunité de se doter d'un local d'injection
 - Opportunité de compléter le dispositif de soins par une consultation héroïne
- **Mandat IUMSP** " contribution à la réflexion sur l'apport de mesures de traitements et de réduction des risques en complément au dispositif vaudois actuel "

Rapport IUMSP 2006

- Méthodologie:
 - Revue de la littérature scientifique sur la prescription médicalisée d'héroïne
 - Réunion de 2 focus groupe (médecins MTD et centres spécialisé, structures bas seuil)
- Identifie 90 pts, consommateurs à haut risque
- Cible le sous groupe de patients qui adhèrent mal aux traitements MTD usuels, injecteurs.

Rapport IUMSP 2006

Prescription médicalisée héroïne nécessaire?

- Oui!
- mais :
 - Pas une priorité dans le canton
 - Sans préteriter les autres programmes existants
 - Sans oublier besoins pour occupation, réinsertion
 - Problème de localisation
 - Intérêt mesuré du CSM pour une prescription d'héroïne orale.

Unité Ambulatoire Spécialisée

UAS – Montreux

	Femmes	Hommes
File active: 280	1/3	2/3
Age (années)	34,5	36.4
Ttt substitution	78 %	75 %
AS / Invalidité	50%	50%
Travail	5 %	28 %
SDF	2%	17%
Profil Héroïne	4	19
HCV	56%	75%
HIV	7 %	10 %

Unité Ambulatoire Spécialisée

UAS – Montreux

- A l'UAS avec ces patients nous observons:
 - Longs suivis (7 ans et plus)
 - Injecteurs non stabilisés
 - Difficultés d'alliance. Taux plus élevé de ruptures et de retours thérapeutiques (moyenne de 5 ouvertures de dossiers successives).
 - Profils psychiatriques: troubles du spectre de la psychose ou affectifs
 - Séjours hospitaliers (psy et somatiques) fréquents, successif, très brefs.
 - Limites des traitements méthadone

Unité Ambulatoire Spécialisée

UAS – Montreux

- Stratégies de soins:
 - Niveau de soins adapté, progr. MTD " bas seuil ".
 - Réguler le niveau d'intensité du contact thérapeutique-objectif de continuité de soins.
 - Soins et besoins de base.
 - Intervention ponctuelle dans les phases aiguës.
 - Distribution de mat. stérile
 - Prévention tertiaire active
 - Travail d'information et d'explication aux réseaux de soins

Centre St-Martin - 1996

Contexte à ouverture :

- Pénurie ttt substitution
- Politique des 4 Piliers refusée par gouvernement vaudois
« On ne pactise pas avec la drogue »
- Expérience Médecin rue
-> contact existant / proximité

CSM : Garder le contact

- Adaptation programme MTD pour garder pts dans réseau
- Accompagner la personne dans la réalisation de ses demandes/objectifs
 - Dans un cadre précis
 - Avec disponibilité importante et réfléchie
 - Bcp de créativité, de résistance et de mémoire
- Accent mis dans la continuité des soins
- One point shopping
 - soins somatiques (suivis HIV, Ttt HCV,...)
 - interventions sociales

CSM : File active sept 08 – 329 pts

	Femmes	Hommes
	96	233 (71%)
Age (années)	36.3 (18-57)	37.2 (18-54)
Ttt substitution		89 %
Suivi moyen		5.5 ans (1-12)
Suivi < 1 an		61
Suivis > ou = 10 ans		20 %

CSM : File active sept 08 – 329 pts

	Femmes	Hommes
	96	233 (71%)
Aide sociale	50 %	50 %
AI	40 %	30 %
Travail	9 %	20 %
Logement stable	85%	

HCV	68 %
HIV	20 %




Infections récentes par le VIH Genève-Lausanne 2000 - 2004



Résultats:

- A Genève: 63 infections récentes entre 2000 et 2004 dont 16% chez des usagers de drogues iv.
- A Lausanne: 140 infections récentes entre 2000 et 2004 dont 36% chez des usagers de drogues iv.
- Un test statistique démontre que cette différence n'est probablement pas due au hasard.



CSM : File active sept 08 – 329 pts

Consommations délétères * Cocaïne/BZD/OH/Héroïne	34 %
---	------

* Les référents proposeraient prescription héroïne à la moitié de ces patients ~ 60

Aurait-on pu éviter dégradation situation, infection HIV, ... avec prescription héroïne ?

Même si aggravations observées ont eu lieu dans un contexte de consommation cocaïne ?

le Passage



FONDATION ABS
Accueil à Bas Seuil

**Centre d'accueil et d'information
Place du Vallon 4
1005 Lausanne**

Tél. 021 311 11 15

Fax 021 311 11 18

Courriel : abs@urbanet.ch Site web : www.fondationabs.ch

Horaires d'ouverture

Lundi 10h00 à 16h00

Mardi 10h00 à 16h00

Mercredi 10h00 à 16h00

Jeudi 13h00 à 16h00

Vendredi 10h00 à 16h00

Samedi 10h00 à 14h00

Dimanche 10h00 à 14h00

Petits déjeuners

Tous les jours de 10h00 à 11h30, sauf le jeudi

Repas


**Tous les jours de 12h30 à 13h30, sauf le jeudi collation
de 13h00 à 14h00**

**Matériel stérile et cornets alimentaire
Tous les jours aux heures d'ouverture**

Profil de la clientèle

- 63 personnes en moyenne/j
- > 23'000 contacts par année.
- 714 pers. différentes depuis septembre 2004 dont 562 hommes et 152 femmes.
- ~ 250 nouvelles pers./an qui demandent à être accueillies dont
- ~ 120 personnes acceptées.

Profil de la clientèle matériel d'injection




Fréquentation du Distribubus - 2007

- 43'237 seringues échangées et remises
- 7'844 contacts
- 500 et 700 personnes différentes.


Par mois :

- 3'600 seringues
- 650 contacts


Fondation ABS Fréquentation Dtribus 2007



Profil de la clientèle



Profil de la clientèle





- Distribus : env. 700 pers. différentes/ VD
 - 1/3 insérées
 - 1/3 fortement désinsérées -> Passage
 - 1/3 difficilement identifiables

- => Personnes concernées par prescription héroïne selon exigences OFSP : 100-150 pers.

Questions aux HegeBe

- Chez des patients qui ont expérimenté programme MTD bas seuil, peut-on passer à un programme héroïne à haut niveau d'exigence ?
- Canton VD : problème de localisation
- Produit qui fait effet ?
alors DAM IR pourrait suffire => coûts diminués
- Injection qui fait effet ?
alors que penser d'un programme prescription d'un autre produit injectable que l'héroïne
=> opposition politique contournée