

INJECTION DU FACTEUR DE COAGULATION

Soins des veines avant l'injection

- Changer régulièrement le site d'injection (si possible)
- Si besoin, chauffer le site d'injection, soit avec un bain d'eau tiède, soit avec un coussin chauffant

Préparation

- Le plan de travail doit être propre
- Se laver les mains ou les désinfecter
- Préparer une boîte/pot de confiture où l'on peut mettre les aiguilles
- Préparer des petites compresses/tampons pour la désinfection et la compression du site d'injection
- Reconstituer le produit et le mettre dans la seringue ;
- éventuellement laisser un peu d'air dans la seringue

Injection

- Chercher une veine
- Mettre le bras ou la main sur un coussin
- Mettre le garrot et le serrer
- Ouvrir et fermer la main plusieurs fois pour faire apparaître les veines
- Déterminer le site d'injection et désinfecter
- Tenir l'aiguille parallèlement aux veines et piquer avec un angle d'env. 20°
- Desserrer le garrot
- Laisser couler le sang jusqu'à la fin du tuyau
- Connecter la seringue et injecter lentement le produit (env. 2ml/mn)
- A la fin, injecter un peu d'air dans le tuyau pour que tout le produit passe dans la veine (éviter d'injecter de l'air dans la veine)
- Retirer l'aiguille, la mettre dans le récipient préparé à cet effet et comprimer à l'aide d'un tampon le site d'injection pendant au moins deux minutes.

