

# Antécédent (ATCD) réaction allergique généralisée

V5 06\_05\_21: Authors:  
A. Allgöwer, M. Dubroca, F. Jacquieroz, T. Harr,  
D. Allali

**Excipients contre-indiqués: \***  
Polyéthylène-glycol (PEG, macrogol)\*  
Trométhamine (TRIS, trométamol)\*  
Polysorbate\*

Réaction locale tardive (rougeur, tuméfaction)

Vaccin ok  
Surveillance 15'

## Stade I à IV

(prurit ou urticaire généralisée, angio-œdème, asthme, choc)

Médicamenteux

Non médicamenteux

(p. ex. aliments, hyménoptères,  
désinfectants, latex)

ATCD de Mastocytose,  
tryptase élevée,  
urticaire chronique

Pré-médication par  
antihistaminique 1h avant

**Allergie connue aux excipients \*et produits suivants:**

- en administration IV/IA/IM, SCUT, intra-articulaire :

**Polyéthylène-glycol (PEG, macrogol)**

**Trométhamine (TRIS, trométamol)**

**Polysorbate**

**Vaccin Covid (immédiat et tardif généralisée)**

- en administration orale:

**Laxatifs type Macrogol/PEG**

Non

Mode d'administration

Per os

Parentéral (IV, IM, SC, I.articul,  
I.artériel), laxatifs, ou vaccin

Identifié et

- absence d'excipients contre-indiqué (\*) (cf compendium)
- pas vaccin Covid

Non identifié

Oui

Vaccin ok  
Surveillance 30`

Contre-indication  
Avis allergologique 36330  
Consultations.sia@hcuge.ch

### Questions fréquentes:

**Allergie à un produit contenant traces de polysorbate:**

Si réaction immédiate → CI vaccin → consult. allergo

Si réaction tardive → ok

**Allergie aux produit de contraste (contient TRIS):**

**Donner Pfizer, surveillance 30'**

Moderna contre-indiqué