Interactions médicamenteuses possibles

Un nombre important de médicaments interagissent avec le tacrolimus (Prograf®) et peuvent ainsi modifier les concentrations sanguines du tacrolimus chez votre enfant. Cela peut nécessiter une adaptation de la dose du tacrolimus ou de l'autre médicament.

Pour cette raison, **il est très important** que vous informiez toute personne amenée à prescrire un traitement à votre enfant (médecin, personnel soignant de l'hôpital,pharmacien, etc.), si votre enfant prend d'autres médicaments, y.c. les médicaments prescrits mais également les médicaments en vente libre (sans ordonnance) ou les produits à base d'herbes médicinales (phytothérapie, médecine chinoise, etc.) ou autres produits naturels.

De même, il est **important d'informer le Centre** avant de donner d'autres médicaments à votre enfant (sous ordonnance, en vente libre, produits à base d'herbes médicinales, etc.).

En cas de doute ou de questions, n'hésitez pas à contacter le Centre au +41 (0)22 372 46 60.

!!!! Cette liste n'est pas exhaustive !!!

	Risque de **diminution** des taux sanguins de Prograf®	Risque **d'augmentation** des taux sanguins de Prograf®	Risque d'accentuation de la toxicité pour les reins
Antibiotiques			
Clarithromycine, Erythromycine		↑↑	
Azithromycine	**Pas d'interaction significative**		
Ciprofloxacine		↑	
Aminoglycoside : Amikacine Gentamicine Etc …			⚠
Cotrimoxazole			⚠
Autres anti-infectieux			
Rifampicine	↓↓		
Ganciclovir/valganciclovir			⚠
Amphotéricine B			⚠
Fluconazole, kétoconazole, itraconazole, voriconazole		↑↑	
Casponfungine		↓	
Antirétroviraux (tt HIV et HBV)			
Nelfinavir, ritonavir, lopinavir, atazanavir		↑↑	
Nevirapine, efavirenz		↓↓	
Anti-hypertenseurs			
Diltiazem		↑↑	
Vérapamil		↑↑	
Nifédipine		↑	

Amlodipine		↑	
Nicardipine		↑	
Anti-arythmiques			
Amiodarone		↑↑	
Anti-convulsivants			
Phénobarbital	↓↓		
Phénytoïne	↓↓		
Carbamazépine	↓↓		
Oxcarbamazépine	↓		
Antidépresseurs			
Fluoxétine		↑	
Corticoïdes			
Dexaméthasone/prednisone	↓		
Methylpredisolone		↑ ?	
Antacides			
(Es)oméprazole	↑		
Lansoprazole	↑		
Pantoprazole	↑		
Bicarbonate de Sodium	↓		
Antinauséeux			
Métoclopramide		↑	
Aprépitant		↑	
Hormones sexuelles, contraceptifs oraux			
Danazole		↑	
Ethinylestradiol		↑	
Antidouleurs, fébrifuges			
AINS : Ibuprofène (Brufen, Algifor, Advil) Acide méfénamique (Ponstan) Diclofénac (Voltaren) Ketorolac (Toradol)			⚠⚠⚠ **Toxique pour les reins**
Diurétiques			
Diurétique épargne potassium			⚠ ↑ Hyperkaliémie
Principes actifs végétaux			
Pamplemousse		↑	
Millepertuis	↓		
Plantes chinoises, phytothérapie	↓ ou ↑		
Réglisse en grande quantité			! HTA

Légendes :

↑ : Risque d'augmentation
↑↑ : Risque d'augmentation important
↓ : Risque de diminution
↓↓ : Risque de diminution important

⚠ : Attention ! Risque IMPORTANT d'accentuation de toxicité !
⚠⚠⚠ : Attention ! Risque TRÈS IMPORTANT d'accentuation de toxicité !!!

References

Christians U, Jacobsen W, Benet LZ, Lampen A. Mechanisms of clinically relevant drug interactions associated with tacrolimus. Clin Pharmacokinet. 2002;41(11):813-51. Review.

Iwasaki K, Matsuda H, Nagase K, Shiraga T, Tokuma Y, Uchida K. Effects of twenty-three drugs on the metabolism of FK506 by human liver microsomes. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1993 Nov;82(2):209-16.

Swissmedic info

Dernière mise à jour: avril 2023