Hôpitaux Universitaires Genève

DIAGNOSTIQUE / Service de Médecine de Laboratoire
Centre d'accueil des prélèvements (CAP)
Bâtiment des Laboratoires (BATLab), local 8D-0-850.1
4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14

Laboratoire d'immunologie et d'allergologie clinique

LIAC - Std

https://www.hug.ch/feuilles-de-demande

Responsable du laboratoire : Dr David Spoerl
Labo direct ou résultats : Tél.: (022 37) 29 373 Fax : (022 37) 21 842
E-mail : Liac.laboratoire@hug.ch
Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tél (022 37) 21 800

M. ❑ Mme ❑ (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom:……

Nom de jeune fille :……

Prénom :……

Date de naissance : ..... / ..... / ……

Représentant légal si patient mineur : ❑père ❑mère

Nom/prénom : ……

Rue/N°:……

Localité, No postal :……

Unité d'hospitalisation : …… Médecin :……

N° EdS : ……

Adresse pour facturation: ❑Patient ❑Demandeur ❑Assurance

Nature du cas : ❑Maladie ❑AI ❑Accident ❑Maternité

N° AVS (AI obligatoire) : ……

Assurance : …… **N° Assuré :** ……

Prescripteur *(Nom*/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax) ***:***

Médecins en copie *(Nom*/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax : *Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :*

Votre référence :

Prélèvement du : **Heure :**

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

❑ **Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG**

SANG VEINEUX

ALLERGIE

G4 o Eosinophiles cationique protéine (ECP)
N6 o Immunoglobulines E (IgE) spécifiques
(A préciser sur document LIAC IgE Spécifiques)
N6 o Immunoglobulines E (IgE) totales
N6 o Phadiatop adulte
N6 o Tryptase

PRECIPITINES / IgG SPECIFIQUES

N6 o IgG spécifiques (Pneumo-allergènes)
(A préciser sur document LIAC- Pneuma)

IMMUNOGLOBULINES

Aspect qualitatif

N6 o Cryoglobulines
(2 x 6 ml maintenus à 37°C)
N6 o Immunofixation

Aspect quantitatif (dosage)

N6 o Immunoglobulines D
N6 o Immunoglobulines (G, A, M)
N6 o IgG sous-classes
N6 o Ig, Chaînes légères libres κλ

COMPLEMENT

E3 o C1 inhibiteur fonctionnel
N6 o C1 estérase inhibiteur pondéral
N6 o Complément voie classique (CH50)
N6 o Complément C3 /C4
N6 o Complément C3
N6 o Complément C4

ERYTHROPOIETINE (EPO)

G4 o Dosage érythropoïétine [na]

AUTO-ANTICORPS

Anticorps anti-nucléaires

N6 o anti-nucléaire (ANA)
N6 o anti-ADN db
N6 o anti-histones
N6 o anti-nucléoprotéines dépistage
(SSA, SSB, n-RNP,Sm,Scl70,Jo1)

Pour prescripteurs externes à préciser :

N6 o anti-nucléoprotéines spécificités

o Anti-SSA Ro60 o Anti-SSA Ro52 o Anti-SSB
o Anti-n-RNP o Anti-Sm o Anti-Scl70
o Anti-Jo1

N6 o anti-nucléosomes
N6 o Polymyosite, profil
(Jo1, PL7, PL12, EJ, OJ [na], SRP, Mi2, MDA-5, TIF1-gamma, SAE1, SAE2 et NXP2.)
N6 o anti-ribosomes P0 (r-RNP)
N6 o Sclérose systémique, profil
(Scl70, Cenp A/B, RNA Pol 3, fibrillarine, NOR 90, Th/TO, PM-Scl, Ku et SSA 52)

Anticorps dans les maladies digestives

N6 o anti-actine (muscle lisse)
N6 o anti-ATPase H+/K+ (c.pariétales)
N6 o anti-facteur intrinsèque
N6 o Hépatopathies AI, profil
(actine, LKM1, M2, SLA, LC1)
N6 o anti-LKM
N6 o anti-mitochondries

Pour prescripteurs externes à préciser :

N6 o anti-mitochondries M2

N6 o anti-transglutaminase tissulaire IgA (tTG)
Les IgA seront également dosées
N6 o anti-gliadine désaminée IgG (DGP)

Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles

N6 o dépistage ANCA-PR3 et ANCA-MPO
N6 o ANCA-PR3
N6 o ANCA-MPO

Anticorps des maladies neurologiques et musculaires

N6 o anti-récepteur de l'acétylcholine
N6 o anti-gangliosides, profils IgG/IgM
(anti-GM1, GT1a, GD1a, GD1b, GQ1b)
N6 o anti-MAG
N6 o anti-muscle strié
N6 o anti-NMO dépistage par IF

Anticorps dans les maladies endocriniennes

N6 o anti-ilôts de Langerhans
N6 o Bilan des anticorps anti-surrénale
(anti-surrénale par IFI, anti-21-OH par ELISA)

Pour prescripteurs externes à préciser :

N6 o anti-21-OH

N6 o anti-thyroglobuline (TG)
N6 o anti-thyropéroxydase (TPO)
N6 o anti-récepteur de la TSH (TRAb)

Divers

N6 o anti-C1q
N2 o anti-streptolysine O (ASLO)
N6 o anti-membrane basale glomérulaire (MBG)
N6 o anti-récepteur de la phospholipase (PLA2-R)

Anticorps dans les maladies rhumatologiques

N6 o Facteur rhumatoïde IgA (FRIgA)
N6 o Facteur rhumatoïde IgM (FRIgM)
N6 o anti-peptide citrulliné CCP (ACPA)

Suite au verso ➔

[na] = *analyse hors du domaine accrédité.*

N2 = sang natif → Hémogard rouge 2 ml	**E3** = sang EDTA→ Hémogard mauve 3 ml	**H6** = sang hépariné→ Hémogard vert 6 l
N4 = sang natif → Hémogard rouge 4 ml	**G4** = sang natif+gel → Hémogard jaune 3.5 ml	**TVCPT** = Vacutainer CPT bleu-noir 8 ml
N6 = sang natif → Hémogard rouge 6 ml	**B4** = liquide natif→ Hémogard beige 4 ml	**Pédiatrie** → se référer au RPA

SANG VEINEUX

CYTOKINES

N4 o profil 1 : TNFα, IL-6
N4 o profil 2 : TNFα, IL-6, IL-8, IL-1Ra
N4 o profil 3 : TNFα, IL-6, IL-8, IL-1Ra, MCP-1, IL- 1b, IL-10, IL-17
N4 o profil 4 : IFNγ, IL-2, IL-4

Cytokines Autres

N4 o VEGF-A
N4 o sIL-2R (sCD25) *(NA)*

TESTS CELLULAIRES

H6 o Quantiferon – TB

Uniquement sur rendez-vous
022 372 93 73
Test biologique nécessitant des conditions particulières de prélèvement.
Le matériel doit parvenir au CAP local 9N-0.850.1 avant 9h00 le matin.

TVCPT ❑ T-SPOT TB

LCR

IMMUNOGLOBULINES

Aspect quantitatif (dosage)

B4 o Immunoglobulines (G, A, M) et albumine

CYTOKINES

B4 o Cytokines IL-6, IL-8 et IL-10

URINE 24h

B4 o Immunofixation
Obligatoire volume/24h :

LIQUIDE

Matériel à préciser :

CYTOKINES

B4 o **Autres cytokines (à préciser) (NA)**

o **IL-6**	o TNF Alpha	o IL-8	o IL-1-Beta
o **IL-10**	o IFN gamma	o IL-4	o IL-1Ra
o MCP-1	o IL-17	o IL-2	o VEGF-A

[na] = *analyse hors du domaine accrédité.*

N2 = sang natif → Hémogard rouge 2 ml	**E3** = sang EDTA→ Hémogard mauve 3 ml	**H6** = sang héparin→ Hémogard vert 6 l
N4 = sang natif → Hémogard rouge 4 ml	**G4** = sang natif+gel → Hémogard jaune 3.5 ml	**TVCPT** = Vacutainer CPT bleu-noir 8 ml
N6 = sang natif → Hémogard rouge 6 ml	**B4** = liquide natif→ Hémogard beige 4 ml	**Pédiatrie** → se référer au RPA

Prière de lire attentivement les remarques ci-dessous.

REMARQUES IMPORTANTES

Les échantillons adressés dans de mauvaises conditions ne pourront être traités.

ECP : L'échantillon doit être acheminé dans les 60 minutes qui suivent le prélèvement.

Cryoglobulines : 12 ml (2xN6) de sang natif. Le sang après la prise doit être gardé au chaud à 37 °C et immédiatement apporté au laboratoire pour coagulation à 37 °C. Réception le vendredi jusqu'à 14h.

Complément voie classique CH50 : L'échantillon doit être acheminé dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.
Il est possible d'adresser 2 tubes de sérum congelé au maximum 2 heures après le prélèvement (2 X 1 ml).
Ne pas prélever en dehors des heures d'ouverture du Laboratoire.

Fraction du complément C1 inhibiteur fonctionnel : 3 ml de sang sur EDTA (E3). L'échantillon doit être acheminé dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.
Il est possible d'adresser 2 tubes de plasma congelé au maximum 2 heures après le prélèvement (2 X 1 ml).
Ne pas prélever en dehors des heures d'ouverture du laboratoire.

Cytokines : L'échantillon doit être acheminé dans les 12 heures qui suivent le prélèvement.
Il est possible d'adresser 2 tubes de sérum congelé au maximum 12 heures après le prélèvement (2 X 1 ml).

IgE spécifiques : Préciser les anticorps recherchés sur le document **LIAC-IgE Spécifiques**.

T - SPOT TB : Vacutainer CPT bleu-noir 8 ml. Analyses effectuées sur rendez-vous uniquement 022 372 93 73

Quantiferon - TB : Le prélèvement doit être stocké à température ambiante. Il doit parvenir sans délai au Centre d'Accueil des Prélèvements (CAP-Réception).
Envoi possible des prélèvements du lundi 8h au jeudi 15h.
Attention, le jeudi les prélèvements doivent parvenir au Centre d'Accueil des Prélèvements (CAP-Réception) avant 15h.
Ne pas envoyer d'échantillon : le vendredi, le week-end et les jours fériés (la veille ou le jour lui-même).

Instructions supplémentaires sur le site : https://www.hug.ch/rpa