



Hôpitaux
Universitaires
Genève



DIAGNOSTIQUE / Service de Médecine de Laboratoire
Centre d'accueil des prélèvements (CAP)
Bâtiment des Laboratoires (BATLab), local 8D-0-850.1
4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14

Laboratoire de virologie

VIRO-Analysen

<http://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Laborleiter : Dr Manuel SCHIBLER

Tel./Fax : (022 37) 24 980 / (022 37) 21 835

E-mail : Virologie.reception@hug.ch

Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tel. : (022 37) 21 800

Herr ☐ Frau ☐ (Bitte in Druckschrift)

Name :

Mädchenname :

Vorname :

Geburtsdatum : / /

Gesetzlicher Vertreter für minderjährige Patienten : ☐ Vater ☐ Mutter

Name/Vorname :

Adresse/N° :

Postleitzahl/Ortschaft :

Stationäre Einheit : Arzt :

EdS N° :

Adresse für Rechnung : ☐ Patient ☐ Auftraggeber ☐ Versicherung

Natur des Falles : ☐ Krankheit ☐ IV ☐ Unfall ☐ Mutterschaft

AHV N° (obligatorisch für IV) :

Versicherung : Versicherungsnummer :

Vorschriftsberechtigter (Name/Vorname - Adresse/N° - Postleitzahl/Ortschaft - Tel/Fax) :

Labor Identifizierung :

Arzt in Kopie: (Name/Vorname - Adresse/N° - Postleitzahl/Ortschaft - Tel/Fax) *Das Labor/Vorschriftsberechtigter hat das Abkommen des Vorschriftsberechtigter/Patient erhalten, um anderen Ärzten als der Verschreibende Arzt Kopien zu übermitteln.*

Datum der Probe :

Zeit :

Obligatorische Angaben (Diagnose und/oder Behandlung usw.) :

☐ Reisen (Abreise- und Rückreisedaten, Reiseziele):

☐ Impfung in den letzten 6 Monaten ; wenn ja, bitte präzisieren:

☐ Opposition des Patienten an der Erfassung der Ergebnisse dieses Antrags in der HUG Computer-Patientenakt (DPI).

△ SEHEN SIE BITTE DIE GEFÄSSE UNTEN AUF SEITE 3 △

BLUTUNTERSUCHUNGEN

DRINGLICHKEITEN

☐ Organtransplantation

Gefässe

2xG5+2xE6

Gefässe

IMMUNITÄTSFORSCHUNG ODER IMPFFORSCHUNG

☐ Hepatitis A (HAV), Ig

G5

☐ Mumps, IgG

G5

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBc, Ig

G5

☐ Parvovirus B19, IgG

G5

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBs, Ig

G5

☐ Masern, IgG

G5

☐ Cytomegalovirus, IgG

G5

☐ Röteln, IgG

G5

☐ Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA)

G5

☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), IgG

G5

☐ Herpes simplex 1, IgG

G5

☐ Japanische Enzephalitis, IgG

G5

☐ Herpes simplex 2, IgG

G5

☐ Gelbfieber, IgG

G5

☐ Herpesvirus 6, IgG

G5

☐ SARS-CoV-2, anti-S et -N Ig

G5

☐ Varizella Zoster, IgG

G5

☐ Zika Virus, IgG

G5

☐ Toxoplasmose, IgG

G5

☐ Dengue, IgG, qI

G5

HIV UND RETROVIREN

☐ VIH 1+2, screening

G5

☐ HTLV 1+2, Ig

G5

☐ VIH 1+2, Ig, immunoblot

G5

☐ HTLV 1+2, Ig, immunoblot

G5

☐ Lymphozyten T : CD3/CD4/CD8

E3

☐ HIV Kohorte Nachsorge ohne Lagerung

2xE6+1xE3

☐ VIH1, RNA, PCR, qn

E6

☐ HIV Kohorte Nachsorge mit Zellen Lagerung

2xE6+1xE3

☐ VIH2, RNA, PCR, qn ^(stt)

E6

☐ HIV Kohorte Nachsorge mit Plasma Lagerung

2xE6+1xE3

☐ VIH1, Resistenz gegen antivirale Wirkstoffe 0

E6

HEPATITIS

☐ Akutes Hepatitis Screening

1xG5+1xE6

☐ Hepatitis-B-Screening (HBV) HBsAg + HBsIg + HBcIg

G5

Hepatitis A, Ig+IgM / Hepatitis B, Anti HBc IgM+Ag HBs

Hepatitis E, IgG+IgM / Hepatitis C RNA, PCR, qn

☐ Hepatitis A (HAV), Ig, Screening

G5

☐ Hepatitis C (HCV), Ig, Screening

G5

☐ Hepatitis A (HAV), IgM

G5

☐ Hepatitis C (HCV), Ig, immunoblot

G5

☐ Hepatitis A (HAV), RNA, PCR, qI

E6

☐ Hepatitis C (HCV), RNA, PCR, qn

E6

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBc, Ig

G5

☐ Hepatitis C (HCV), genotyp

E6

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBc, IgM

G5

☐ Hepatitis C (HCV), Resistenz gegen antivirale Wirkstoffe 0

E6

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBe, Ig

G5

☐ Hepatitis D (HDV), Ig

G5

☐ Hepatitis B (HBV), anti-HBs, Ig

G5

☐ Hepatitis E (HEV), IgG

G5

☐ Hepatitis B (HBV), Ag HBs

G5

☐ Hepatitis E (HEV), IgG, immunoblot

G5

☐ Hepatitis B (HBV), Ag HBe

G5

☐ Hepatitis E (HEV), IgM, immunoblot

G5

☐ Hepatitis B (HBV), DNA, PCR, qn

E6

☐ Hepatitis E (HEV), IgM, immunoblot

G5

VIREN AUS DER HERPES-GRUPPE

☐ Cytomegalovirus, IgG

G5

☐ Herpesvirus 1+2 und Varizella Zoster, DNA, PCR qI♦

E6

☐ Cytomegalovirus, IgG, aviditätstest

G5

☐ Herpesvirus 1+2, DNA, PCR qI♦

E6

☐ Cytomegalovirus, IgM

G5

☐ Herpesvirus 6, IgG

G5

☐ Cytomegalovirus, DNA, PCR, qn

E6

☐ Herpesvirus 6, DNA, PCR, qn♦

E6

☐ Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA) und IgM (VCA)

G5

☐ Herpesvirus 8, DNA, PCR, qI♦

E6

☐ Epstein-Barr virus, DNA, PCR, qn

E6

☐ Varizella Zoster, IgG

G5

☐ Herpes simplex 1, IgG

G5

☐ Varizella Zoster, IgM

G5

ANDEREN VIROSEN

☐ Adenovirus, DNA, PCR, qn ☐	E6
☐ BK, DNA, PCR, qn	E6
☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), IgG und IgM	G5
☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), RNA PCR qI	E6
☐ Enterovirus, RNA, PCR, qI	E6
☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	E6
☐ Mumps, IgG	G5
☐ Mumps, IgM	G5
☐ Mumps, RNA, PCR, qI	E6
☐ Pan-Phlebovirus, IgG, IgM (Toscana, Cyprus, Naples et Sicilian)	G5

Gefässe

☐ Parvovirus B19, IgG	G5
☐ Parvovirus B19, IgM	G5
☐ Parvovirus B19, DNA, PCR, qn ☐	E6
☐ Masern, IgG	G5
☐ Masern, IgM	G5
☐ Röteln, IgG	G5
☐ Röteln, IgM	G5
☐ Toscana, RNA, PCR, qI	E6
☐ Lymphozytäre Choriomeningitis Virus (LCMV), RNA, PCR, qI ^(NA)	E6

Wenn es sich bei den unten aufgeführten Anträgen um Bestätigungen (ohne Rechnung) handelt, verwenden Sie bitte den folgenden Link: [CRIVE-CNRRR](#)

☐ Chikungunya IgG und IgM, qn	G5
☐ Chikungunya, RNA, PCR, qI	E6
☐ Dengue Ag/Ig-Schnelltest (Akute Infektionsforschung)	G5
☐ Dengue, RNA, PCR, qI	E6
☐ Japanische Enzephalitis, IgG und IgM	G5
☐ Gelbfieber, IgG und IgM	G5
☐ Gelbfieber, RNA, PCR, qI	E6
☐ Hantavirus, IgG et IgM	G5
☐ Hantavirus Europa, RNA, PCR, qI ^(NA) (Puumala, Dobrava, Tula)	E6
☐ Hantavirus Asien, RNA, PCR, qI ^(NA) (Hantaan, Seoul)	E6
☐ Hantavirus Amerika, RNA, PCR, qI ^(NA) (Sin nombre, Andes)	E6

☐ Mayaro, RNA, PCR, qI ^(NA)	E6
☐ Rift-Tal Fieber, RNA, PCR, qI ^(NA)	E6
☐ Röteln, RNA, PCR, qI	E6
☐ West Nile virus, IgG und IgM	G5
☐ West Nile virus, RNA, PCR, qI	E6
☐ Zika Virus, IgG und IgM	G5
☐ Zika Virus, RNA, PCR, qI	E6

BAKTERIOLOGIE UND PARASITOLOGIE

☐ Borreliose (Lyme), IgG, screening	G5
☐ Borreliose (Lyme), IgG, immunoblot	G5
☐ Borreliose (Lyme), IgM, screening	G5
☐ Borreliose (Lyme), IgM, immunoblot	G5
☐ Entamoeba histolytica, IgG	G5
☐ Q-Fieber, Coxiella Burnetii, IgG und IgM	G5

☐ Toxoplasmose, IgG	G5
☐ Toxoplasmose, IgM	G5
☐ Toxoplasmose, DNA, PCR, qI ☐	E6
☐ Angeborene Toxoplasmose, IgG, immunoblot, Profilvergleich	
☐ Bei der Geburt (Mutter-Kind Vergleich)	
→ Blut der Mutter bei der Geburt	G5
→ Nabelschnurblut ☐ Neugeborenenblut ☐ date/....../....	G3
☐ Im Nachgang :	
→ Kinderblut (datum:....../....../....)	G3
→ Bereitstellung von vorderem Serum (datum:....../....../....) ou oder wenn schon bei uns ☐	G3

LAGERUNG

☐ Zellen Lagerung	2xE6
☐ Plasma Lagerung	E6

☐ Spenderlagerung	G5
--	----

UNTERSUCHUNGEN RESPIRATORISCHER PROBEN**NASOPHARYNGEALE ABSTRICH**

☐ Respiratorische, PCR (Panel FluA/B, VRS, SARS-CoV2)	COP-E
☐ Respiratorische, PCR (Komplette Panel: FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COP-E
☐ Mumps, RNA, PCR, qI	COP-E

NASOPHARYNX ABSAUGUNG

☐ Respiratorische, PCR (FluA/B, VRS, SARS-CoV2 Panel)	COPAN
☐ Respiratorische, PCR (Komplette Panel: FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN
☐ Mumps, RNA, PCR, qI	COPAN

BRONCHOALVEOLARE LAVAGE (BAL)

☐ Respiratorische, PCR (FluA/B, VRS, SARS-CoV2 Panel)	COPAN
☐ Respiratorische, PCR (Komplette Panel: FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN
☐ Herpes simplex 1+2, DNA, PCR qI	COPAN
☐ Herpesvirus 8, DNA, PCR, qI ^(NA)	COPAN

BRONCHIALE ABSAUGUNG

☐ Respiratorische, PCR (FluA/B, VRS, SARS-CoV2 Panel)	COPAN
☐ Respiratorische, PCR (Komplette Panel: FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN

Nur für immunsupprimierte Patienten:

☐ Cytomegalovirus, DNA, PCR, qI	COPAN
--	-------

OROPHARYNGEALE ABSTRICH

☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	COP-E
--	-------

Wenn es sich bei den unten aufgeführten Anträgen um Bestätigungen (ohne Rechnung) handelt, verwenden Sie bitte den folgenden Link: [CRIVE-CNRRR](#)

NASOPHARYNGEALE ABSTRICH

☐ Masern, RNA, PCR, qI (Entdeckung)	COP-E
☐ Röteln, RNA, PCR, qI	COP-E

NASOPHARYNX ABSAUGUNG

☐ Röteln, RNA, PCR, qI ^(NA)	COPAN
---	-------

ZEREBROSPINALFLÜSSIGKEIT

☐ Chikungunya, RNA, PCR, qI	B4
☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), RNA, PCR,	B4
☐ Epstein-Barr virus, DNA, PCR, qn	B4
☐ Infektionen des ZNS, Panel Viren/Bakterien PCR	B4
☐ JC Polyomavirus, DNA, PCR immunsupprimierten	B4
☐ Mumps, RNA, PCR, qI	B4

☐ Toscana, RNA, PCR, qI	B4
☐ Toxoplasmose, DNA, PCR, qI	B4
☐ VIH, RNA, PCR, qn	B4
☐ Lymphozytäre Choriomeningitis Virus (LCMV), RNA, PCR, qI	B4

Intrathekale IgG produktion 1

☐ Intrathekale Borreliose IgG	B4+G5
☐ Intrathekale Varizella Zoster IgG	B4+G5

Wenn es sich bei den unten aufgeführten Anträgen um Bestätigungen (ohne Rechnung) handelt, verwenden Sie bitte den folgenden Link: [CRIVE-CNRRR](#)

☐ Gelbfieber, RNA, PCR, qI	B4	☐ West Nile virus, RNA, PCR, qI	B4
☐ Masern, RNA, PCR, qI (Entdeckung)	B4		

ANDERE UNTERSUCHUNGSMATERIALIEN			
HAUTABSTRICH	Gefässe	STUHL	Gefässe
☐ Enterovirus, RNA, PCR, qI	COP-E	☐ Blockanalyse von Enterische Viren, PCR, qI (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus I et II, Astrovirus, Sapovirus)	FM60
☐ Herpesvirus 1 + 2 und Varizella Zoster, DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Hepatitis A (HAV), RNA, PCR, qI	FM60
☐ Herpesvirus 1+2, DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Hepatitis E (HEV), RNA, PCR, qI	FM60
☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Rota/Adeno Ag (Schnelltest)	FM60
☐ Varizella Zoster, DNA, PCR, qI	COP-E	ANALABSTRICH	
		☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	COP-E
GENITALABSTRICH		URIN	
☐ Herpesvirus 1+2 DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Adenovirus, DNA, PCR, qn	B4
☐ Menschlich Papillomavirus (HPV) DNA PCR qI (mit Typisierung)	Thin-Prep	☐ BK, DNA, PCR, qn	B4
☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Cytomegalovirus, DNA, PCR, qn	B4
AUGENABSTRICH		☐ Legionella pneumophila, Ag, Schnelltest	B4
☐ Adenovirus, DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Streptococcus pneumoniae, Ag, Schnelltest	B4
☐ Herpesvirus 1 + 2 und Varizella Zoster, DNA, PCR, qI	COP-E	☐ Urin Lagerung	B4
AUGENFLÜSSIGKEIT		NABELSCHNUBLUTSTAMMZELLEN	
☐ Cytomegalovirus, DNA, PCR, qI	ME1,5	☐ Toxoplasmose, IgG ECLIA	G3
☐ Herpesvirus 1 + 2 und Varizella Zoster, DNA, PCR, qI	ME1,5	☐ Toxoplasmose, IgM ECLIA	G3
☐ Toxoplasmose, DNA, PCR, qI	ME1,5	☐ Angeborene Toxoplasmose IgG, immunoblot Profilvergleich	G3
AMNIONFLÜSSIGKEIT		→ Unbedingt Mutter Serum am Geburt entnehmen	G5
☐ Cytomegalovirus, DNA, PCR, qn	B4	(Cf. Analysen von venösem Blut, kongenitale Toxoplasmose)	
☐ Parvovirus B19 DNA PCR, qn	B4	☐ Plasma Lagerung	E3
☐ Toxoplasmose, DNA, PCR, qI	B4		
SPERMA		BIOPSIE	
☐ Mpox (früher Monkeypox), DNA, PCR, qI	FM60	☐ Herpesvirus 6, DNA, PCR, qI ^(NA) (Fingernägel)	COPAN
		☐ JC Polyomavirus, DNA, PCR, immunsupprimierten ^(NA) (Hirngewebe)	COPAN
Wenn es sich bei den unten aufgeführten Anträgen um Bestätigungen (ohne Rechnung) handelt, verwenden Sie bitte den folgenden Link: CRIVE-CNRRR			
AMNIONFLÜSSIGKEIT		URIN	
☐ Röteln, RNA, PCR, qI	B4	☐ Mayaro, RNA, PCR, qI	B4
		☐ Zika Virus, RNA, PCR, qI	B4

^(NA) Nicht Akkreditiert
^(stt) ausgelagerte Analyse

☐ Der Patient wurde darüber informiert, dass die durch den Charakter  identifizierten Analysen nicht in die aktuelle OFAS-Liste aufgenommen wurden und daher nicht unbedingt von den Krankenkassen übernommen werden (Preis der Analysen ohne Steuern)

0 Spezifisches Formular : https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hiv_d.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hcv_d.pdf

1 Unbedingt Serum am gleichen Tag entnehmen und schicken. **IMPORTANT** Serum und Zerebrospinalflüssigkeit Totale IgG und Albumin Werte geben
Keine Analyse wird ohne diese Werte ausgeführt.

Albumine Konzentration : Blut = g/L, CSF = mg/L	/ Totale IgG Konzentration: Blut = g/L, CSF =mg/L
---	---

GEFÄSSE			
Für Serologien auf Serum : 1 G5 Rohr reicht für 6 Analysen (2 G5 Rohen für mehrere Analysen).			
Für PCR auf plasma : 1 E6 Rohr reicht um die folgenden Analysen zu machen (sich auf das Symbol  beziehen).			
Für andere Virämie: 1 extra E6 Rohr.			
 erforderliche Volumen für PCR auf Zerebrospinalflüssigkeit: VIH 1ml, Epstein-Barr 1ml, andere 0.5ml durch die Analyse.			
Die unter schlechten Bedingungen adressierten Stichproben können nicht behandelt werden.			
B4	Flüssigkeit	-	Beiger Vakutainer 4 ml
E6	EDTA Blut oder Plasma	-	Malvenfarbiger Vakutainer 6 ml
E3	EDTA Blut oder Plasma	-	Malvenfarbiger Vakutainer 3 ml
G5	EDTA Blut + Gel	-	Gelbes Vakutainer Röhrchen 5 ml (Pädiatrie: gelber Hemogard 3.5 ml)
COPAN	Betreffenden Material	-	Rohr mit 3 ml rosa Medium COPAN
COP-E	Betreffenden Material	-	Rohr mit 3 ml rosa Medium COPAN + Tupfer
FM60	Betreffenden Material	-	60 ml Falcon, metall Kappe, verschraubt
ME1,5	Betreffenden Material	-	Microtube / Eppendorf transparenter 1,5 ml Kunststoff ohne Zusätze
Thin-prep	Betreffenden Material	-	Flacon Thin-prep (Pap-test), PreservCyt®solution

Kommentare :.....
.....
.....