

La biopsie mammaire sous stéréotaxie permet de prélever du tissu d'une anomalie visible à la mammographie.

La stéréotaxie est une technique de radiologie en trois dimensions qui apporte des informations précises pour localiser une lésion de petite taille. Elle est également utilisée pour la pose d'un clip métallique avant une opération.

## Que faut-il faire avant ?

- Signalez tout traitement en cours. Si vous prenez des anti-coagulants ou de l'aspirine, le médecin vous expliquera comment interrompre ces médicaments.
- Signalez vos allergies, une éventuelle grossesse, le port de prothèses mammaires.

### **Le jour de l'examen**

- Aucune préparation n'est nécessaire. Evitez simplement d'appliquer sur vos seins des produits cosmétiques (crème, lait de toilette, talc, parfum) et retirez vos bijoux.
- Il n'est pas utile d'être à jeun.
- Amenez votre prescription médicale et les clichés de vos examens précédents (mammographie, échographie).
- Pensez à votre retour : évitez de conduire après votre examen.

### Comment se déroule-t-elle ?

Le médecin radiologue vous installe à plat ventre sur une table munie d'une ouverture permettant le passage d'un sein. Il effectue une anesthésie locale et prélève du tissu sous contrôle stéréotaxique. Le prélèvement est envoyé dans un laboratoire pour analyse et les résultats sont obtenus deux à cinq jours plus tard.

Lorsque l'anomalie est constituée de micro-calcifications et qu'elles ont été enlevées en partie à la biopsie, un clip métallique est placé dans le sein. Celui-ci permet au chirurgien de retrouver l'endroit où il doit intervenir. Sans danger, ce clip est laissé dans le sein jusqu'à l'intervention chirurgicale.

Les résultats sont transmis au médecin qui a demandé la biopsie afin qu'il vous les communique.

### Surveillance

Pour éviter tout risque d'hématome, un pansement compressif est posé sur le point de ponction. Il doit rester en place pendant 24 heures.

Évitez, le jour même, toute utilisation intensive du bras (port de charges) du côté de la ponction.

Signalez aux infirmières l'apparition, dans les heures qui suivent la biopsie, d'un saignement sous le pansement ou d'une tension douloureuse dans le sein (tél. 022 382 44 05).

Si vous prenez des anticoagulants ou de l'aspirine, le médecin vous indiquera à quel moment reprendre votre traitement habituel.

N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à l'équipe médicale et infirmière.

### Unité de sénologie chirurgicale

Bd de la Cluse 30  
1211 Genève 14  
Tél. 022 382 44 05