

Le repérage mammaire est utilisé si la lésion est difficile à palper par le chirurgien. Il consiste à marquer l'endroit de l'anomalie afin que le chirurgien la retrouve facilement lors de l'intervention chirurgicale et enlève le moins possible de tissu mammaire sain.

Que faut-il faire avant ?

- Signalez tout traitement en cours. Si vous prenez des anticoagulants ou de l'aspirine, le médecin vous expliquera comment interrompre ces médicaments.
- Signalez toute allergie, notamment celle aux anesthésiants locaux.

Le jour de l'examen

- Aucune préparation n'est nécessaire. Evitez simplement d'appliquer sur vos seins des produits cosmétiques (crème, lait de toilette, talc, parfum) et retirez vos bijoux.
- Il n'est pas utile d'être à jeun.
- Amenez votre prescription médicale.

Comment se déroule-t-il ?

Le repérage mammaire est en général réalisé la veille de votre intervention chirurgicale.

Le plus souvent, un simple marquage de la peau à l'encre en face de l'anomalie suffit. Celui-ci peut être complété par la pose d'un clip métallique au niveau de la lésion. Dans ce cas-là, le médecin radiologue effectue une anesthésie locale et met le repère en place sous contrôle échographique ou mammographique, parfois sous IRM.

La pose d'un clip métallique n'aggrave pas un éventuel cancer et ne provoque pas son extension.

Surveillance

Dans les heures qui suivent la pose du clip métallique, signalez aux infirmières toute apparition de saignement sous le pansement ou la survenue d'une tension douloureuse dans le sein. Tél. 022 382 44 05 .

Évitez tout mouvement important du bras du côté du repère et le port d'une charge lourde (par ex. valise).

Évitez de dormir à plat ventre ou sur le côté où le clip a été placé.

N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à l'équipe médicale et infirmière.

Unité de sénologie chirurgicale

Bd de la Cluse 30
1211 Genève 14
Tél. 022 382 44 05