

Préparation de la solution d'injection de NovoSeven® Mode de préparation sans Kit de perfusion / « Infusion Kit »

S'appliquent uniquement si vous n'avez pas commandé séparément le Kit de perfusion. Procéder de manière aseptique pendant la préparation et l'administration.

Préparation de la solution d'injection

- Enlevez les capuchons de protection en plastique des deux flacons. (Si les capuchons manquent ou sont lâches, les flacons perforables ne doivent pas être utilisés).
- Désinfectez les bouchons en caoutchouc à l'aide de tampons d'alcool et laissez les sécher avant usage.
- Utilisez une seringue à usage unique de la taille appropriée, fixez l'aiguille solidement sur la seringue.
- Retirez le piston pour faire entrer dans la seringue une quantité d'air correspondant au contenu du flacon de solvant (la quantité indiquée en ml correspond à la valeur en cc sur la seringue).
- Insérez l'aiguille dans le bouchon en caoutchouc du flacon de solvant. Injectez l'air dans le flacon en poussant le piston jusqu'à ce que vous sentiez une nette résistance.
- Tenez la seringue avec le flacon de solvant vers le bas. Assurez-vous que la pointe de l'aiguille se trouve dans le solvant. Tirez le piston pour faire passer le solvant dans la seringue.
- Otez le flacon vide (solvant).
- En insérant l'aiguille dans le flacon de poudre, assurez-vous que vous l'insérez au centre du bouchon en caoutchouc.
- Maintenez la seringue attachée au flacon perforable dirigé vers le bas dans une position légèrement penchée. Pressez lentement le piston, afin d'injecter le solvant dans le flacon perforable contenant la poudre. Assurez-vous que vous ne dirigez pas le jet d'eau directement sur la poudre NovoSeven, car cela pourrait provoquer de la mousse.
- Tournez doucement le flacon perforable jusqu'à dissolution complète de la poudre. Le flacon perforable ne doit pas être agité, car cela provoquerait la formation de mousse.
- Examinez la solution de NovoSeven reconstituée, afin de vérifier la présence d'éventuelles modifications de couleur ou de particules solides.
- La solution reconstituée de NovoSeven ne doit pas être conservée dans la seringue en plastique. Administrez NovoSeven immédiatement après sa préparation.

Administration de la solution injectable

Assurez-vous que le piston est complètement rentré, avant de tourner la seringue à l'envers (le piston pourrait avoir été repoussé par la pression à l'intérieur de la seringue). Si vous utilisez une aiguille, assurez-vous que la pointe de l'aiguille se trouve dans la solution. Tenez la seringue avec le flacon perforable à l'envers, et tirez le piston, afin d'aspirer la totalité de la solution dans la seringue.

- Retirez l'aiguille du flacon et dévissez l'aiguille de la seringue.
- NovoSeven est désormais prêt pour l'injection. Cherchez un site approprié et injectez NovoSeven **lentement** dans une veine (**2ml/min**).
- Éliminez la seringue et les flacons.