

## CHECK-LIST CHC pour la prescription initiale ou le renouvellement (mise à jour 6/2013)

|  | Oui | Non | Commentaire |
|--|-----|-----|-------------|
| <b>A) CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES</b>  |     |     |             |
| Anamnèse/Statut post-TEV/EP  |     |     |             |
| Thrombophilie (connue ou suspectée)  |     |     |             |
| Immobilisation prolongée   |     |     |             |
| Maladie cardiovasculaire / Infarctus du myocarde   |     |     |             |
| Accident vasculaire cérébral   |     |     |             |
| Migraine avec aura   |     |     |             |
| Hypertension artérielle: non traitée / mal contrôlée                                       |     |     |             |
| Hypercholestérolémie/Hyper-TG, sévère  |     |     |             |
| Diabète avec angiopathie   |     |     |             |
| Lupus érythémateux avec atteinte vasculaire  |     |     |             |
| Syndrome hémolyt. et urémique / Purpura thrombotique thrombocytopénique                    |     |     |             |
| Altération de la fonction hépatique, sévère; syndrome de Dubin-Johnson; tumeurs hépatiques |     |     |             |
| Porphyrie aigüe  |     |     |             |
| Cancer du sein / Carcinomes hormonodépendants  |     |     |             |
| Saignements vaginaux, d'origine indéterminée   |     |     |             |
| Présence simultanée de plusieurs facteurs de risques particuliers conformément à B)        |     |     |             |
|  |     |     |             |
| <b>B) Prudence accrue lors des risques suivants (discuter des alternatives aux CHC):</b>   |     |     |             |
| Anamnèse familiale de TEV/EP/thrombophilie*<br>*cf. Handout                                |     |     |             |
| Âge > 35 ans   |     |     |             |
| Tabagisme  |     |     |             |
| Obésité IMC > 30 kg/m <sup>2</sup>   |     |     |             |
| Traumatisme / Intervention chirurgicale  |     |     |             |
| Hypertension, bien contrôlée   |     |     |             |
| Dyslipidémie, modérée  |     |     |             |
| Diabète sucré sans angiopathie   |     |     |             |
| Lupus érythémateux sans atteinte vasculaire  |     |     |             |
| Affection valvulaire en général; fibrillation auriculaire                                  |     |     |             |
| Cholestase pendant la grossesse  |     |     |             |
| Insuffisance rénale, sévère / Dialyse  |     |     |             |
| Migraine sans aura   |     |     |             |
| Épilepsie  |     |     |             |
|  |     |     |             |
| <b>C) Patiente &lt; 18 ans: dotée d'une capacité de discernement</b>                       |     |     |             |

Discussion des risques de TVP, information sur les symptômes de TVP/EP et remise de la fiche destinée aux patientes le: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Entretien ultérieur en cas de questions de la patiente le: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Date / Signature du médecin:

Auteurs : G.S. Merki-Feld, J. Bitzer, J. Seydoux, M. Birkhäuser