

**Echelle FLACC : Face Legs Activity Cry Consolability, modifiée polyhandicap
Elaborée pour mesurer la douleur de la personne handicapée de 0 à 18 ans**

Date	
Heure	
Auteur	

Visage	<p>0 : Pas d'expression particulière ou sourire</p> <p>1 : Grimace ou froncement occasionnel des sourcils, retrait, désintéressé <i>[semble triste ou inquiet]</i></p> <p>2 : Froncements fréquents à permanents des sourcils, mâchoires serrées, tremblement du menton <i>[visage affligé ; expression d'effroi ou de panique]</i></p>	
Jambes	<p>0 : Position habituelle ou détendue</p> <p>1 : Gêné, agité, tendu <i>[trémulations occasionnelles]</i></p> <p>2 : Coups de pieds ou jambes recroquevillées <i>[augmentation marquée de la spasticité, trémulations ou sursauts permanents]</i></p>	
Activité	<p>0 : Allongé calmement, en position habituelle, bouge facilement</p> <p>1 : Se tortille, se balance d'avant en arrière, est tendu <i>[moyennement agité (ex : bouge sa tête d'avant en arrière, agressif) ; respiration superficielle, saccadée, soupirs intermittents]</i></p> <p>2 : Arc-bouté, figé ou sursaute <i>[agitation sévère, se cogne la tête, tremblement (non rigide) ; retient sa respiration, halète ou inspire profondément ; respiration saccadée importante]</i></p>	
Cris	<p>0 : Pas de cris (éveillé ou endormi)</p> <p>1 : Gémissements ou pleurs, plainte occasionnelle <i>[explosion verbale ou grognement occasionnel]</i></p> <p>2 : Pleurs ou cris constants, hurlements ou sanglots, plaintes fréquentes <i>[explosion verbale répétée ou grognement constant]</i></p>	
Consolabilité	<p>0 : Content, détendu</p> <p>1 : Rassuré occasionnellement par le toucher, l'étreinte ou la parole. Peut être distrait</p> <p>2 : Difficile à consoler ou à reconforter <i>[repousse le soignant, s'oppose aux soins et aux gestes de confort]</i></p>	