

FLACC : Face Legs Activity Cry Consolability
Elaborée pour évaluer la douleur postopératoire chez l'enfant de 2 mois à 7 ans. Validée pour mesurer la douleur des soins de 5 à 16 ans
Utilisable pour mesurer la douleur des soins de la naissance à 18 ans.

Date													
Heure													
Auteur													

Visage	0 : Pas d'expression particulière ou sourire												
	1 : Grimace ou froncement occasionnel des sourcils, retrait, désintéressé												
	2 : Froncements fréquents à permanents des sourcils, mâchoires serrées, tremblement du menton												
Jambes	0 : Position habituelle ou détendue												
	1 : Gêné, agité, tendu												
	2 : Coups de pieds ou jambes recroquevillées												
Activité	0 : Allongé calmement, en position habituelle, bouge facilement												
	1 : Se tortille, se balance d'avant en arrière, est tendu												
	2 : Arc-bouté, figé ou sursaute												
Cris	0 : Pas de cris (éveillé ou endormi)												
	1 : Gémissements ou pleurs, plainte occasionnelle												
	2 : Pleurs ou cris constants, hurlements ou sanglots, plaintes fréquentes												
Consolabilité	0 : Content, détendu												
	1 : Rassuré occasionnellement par le toucher, l'étreinte ou la parole. Peut être distrait												
	2 : Difficile à consoler ou à reconforter												