

Echelle Comfort Behavior : évaluation de la douleur et sédation chez l'enfant et le nouveau-né en réanimation

Nom – Prénom :

Date :

Heure :

Eveil				
1 Profondément endormi				
2 Légèrement endormi				
3 Somnolent				
4 Eveillé et vigilant				
5 Hyper attentif				
Calme ou agitation				
1 Calme				
2 Légèrement anxieux				
3 Anxieux				
4 Très anxieux				
5 Paniqué				
Ventilation				
1 Pas de ventilation spontanée, pas de toux				
2 Ventilation spontanée avec peu ou pas de réaction au respirateur				
3 Lutte contre le respirateur ou touse occasionnellement				
4 Lutte activement contre le respirateur ou touse régulièrement				
5 S'oppose au respirateur, touse ou suffoque				
Mouvements				
1 Absence de mouvement				
2 Mouvements légers, occasionnels				
3 Mouvements légers, fréquents				
4 Mouvements énergiques, uniquement aux extrémités				
5 Mouvements énergiques incluant le torse et la tête				
Tonus musculaire soulever, fléchir et étendre un muscle pour l'évaluer				
1 Muscles totalement décontractés, aucune tension musculaire				
2 Tonus musculaire diminué				
3 Tonus musculaire normal				
4 Tonus musculaire augmenté avec flexion des doigts et des orteils				
5 Rigidité musculaire extrême avec flexion des doigts et des orteils				
Tension du visage				
1 Muscles du visage totalement décontractés				
2 Tonus des muscles du visage normal, aucune tension visible				
3 Contracture évidente de quelques muscles du visage				
4 Contracture évidente de l'ensemble des muscles du visage				
5 Muscles du visage contracturés et grimaçants				
Score				