

## Echelle DAN : évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né

Nom, Prénom :

Date :

Heures :

<i>REPONSES FACIALES</i>						
➤ Calme	0	0	0	0	0	0
➤ Pleurniche avec alternance de fermeture et ouverture douce des yeux	1	1	1	1	1	1
<i>Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : Contraction des paupières, froncement des sourcils, ou accentuation des sillons naso-labiaux :</i>						
➤ Légers, intermittents avec retour au calme	2	2	2	2	2	2
➤ Modérés	3	3	3	3	3	3
➤ Très marqués, permanents	4	4	4	4	4	4
<i>MOUVEMENTS DES MEMBRES</i>						
➤ Calme ou mouvements doux	0	0	0	0	0	0
<i>Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : Pédalage, écartement des orteils, membres inférieurs raides et surélevés, agitation des bras, réaction de retrait :</i>						
➤ Légers, intermittents avec retour au calme	1	1	1	1	1	1
➤ Modérés	2	2	2	2	2	2
➤ Très marqués, permanents	3	3	3	3	3	3
<i>EXPRESSION VOCALE DE LA DOULEUR</i>						
➤ Absence de plainte	0	0	0	0	0	0
➤ Gémit brièvement. Pour l'enfant intubé, semble inquiet	1	1	1	1	1	1
➤ Cris intermittents. Pour l'enfant intubé, mimique des cris intermittents	2	2	2	2	2	2
➤ Cris de longue durée, hurlement constant. Pour l'enfant intubé, mimique de cris constants	3	3	3	3	3	3
<b>Score</b>						

Référence : <http://www.pediadol.org>