

## Questionnaire DN4 Douleur neuropathique

### Définition Description Public

- C'est un questionnaire simple de diagnostic pour les douleurs neuropathiques.
- A utiliser par les professionnels **auprès de patients communicants adultes et enfants dès 7 ans**, selon développement psychomoteur.

### Conditions d'utilisation

- A utiliser lorsqu'une douleur neuropathique est suspectée avec des signes d'appel comme : sensation de fourmillements, douleur à l'effleurement (allodynie), sensation de décharges électriques et/ou sensation de brûlure.

### Modalités d'utilisation

- Ce questionnaire comporte 7 items pour l'interrogatoire du patient et 3 items d'examen clinique.
- Ces 10 items sont regroupés dans 4 questions.
- Le questionnaire s'effectue par un médecin
  - Questions 1 et 2 (7 items) : le praticien interroge le patient et remplit le questionnaire.
  - Questions 3 et 4 (3 items) : à partir de l'examen clinique, le praticien remplit les données.
- A chaque item, il doit apporter une réponse OUI ou NON.

### Analyse

- A la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque OUI et 0 pour chaque NON.
- La somme obtenue donne le score du patient, noté sur 10.
- Si le score du patient est égal ou supérieur à 4/10, le test est positif.

### Références

- D.Bouhassira, N.Attal, J.Fermanian, H.Alchaar, M.Gautron, E.Masquelier, S.Rostaing, M. Lanteri-Minet, E.Collin, J.Grisart, F.Boureau. *Development and validation of the Neuropathic Pain Symptom Inventory*. Pain 2004, 108(3) :248-257.

Qu'elle soit aiguë ou chronique, la douleur des patients doit être évaluée régulièrement. Pour une prise en charge de qualité, le Réseau douleur a défini des standards de soins pour l'évaluation de celle-ci :

### [Standards de soins HUG pour l'évaluation de la douleur](#)