

Prise en charge en cas d'accident-exposition sang ou liquide biologique (AES) VHB et VHC

Type d'exposition

Parentérale

Peau ou muqueuse lésée

Sexuelle (vaginale, anale)

VHC: risque présent même lorsque le délai d'utilisation est inconnu (aiguilles dans poubelle...)

En cas d'agression sexuelle: ♀ référer en gynécologie pour le constat; ♂ à adresser au SU adultes. Evaluer: rappel vaccination DITe, test de grossesse.

Personne source

HEPATITE B (VHB)

Ag HBs + connu Status VHB inconnu VHB (-)

Sérologie VHB* sauf si déjà documentée

Stop

1 dose de vaccin Engerix B20 à tous

(sauf si documentation antérieure personne exposée Ac antiHBs > 100U/l)*

Ac anti-HBs > 10U/l

Aucune mesure nécessaire

Ac anti-HBs < 10U/l

Source: AgHBs - ou inconnue

Poursuite vaccination:
1 dose vaccin à 1 + 6 mois

Si expo prof, contrôle sérologie VHB à 3, 6 mois (tant que Ac anti-HBs < 100U/l). Si expo non prof, pas de contrôle sérologique

Le Suivi à organiser par le médecin prescripteur de la prise en charge en urgence

Source: AgHBs +

⚠ Poursuite vaccination:
1 + 6 mois + Immunoglobulines anti-VHB: HBIG**

Personne exposée

Hep B: Attitude en urgence

Hep B: Attitude selon taux AC de la personne exposée

HEPATITE C (VHC)

Selon le type d'exposition:

- Parentérale OU
- Rapport sexuel HSH avec patient source HCV connu

Sérologie VHC à 0, 3, 6 mois + PCR VHC à 6 semaines
Suivi: si PCR + aux mal. infectieuses

Autre type d'exposition

Sérologie VHC à 0 et 3 mois

Pour toute question, cf contacts au dos.

⚠ Employés des HUG: consulter le Service de santé du personnel en semaine de 07h30 à 17h00; sinon consulter à l'Unité d'urgences ambulatoires (entrée des urgences adultes), puis contacter SSP pour le suivi.



* Personne exposée: le taux d'anticorps anti-HBs est à obtenir dans le 24-48 heures. Le personnel soignant devrait être vacciné et la réponse vaccinale connue: pour les répondeurs (Ac anti-HBs > 100 U/l), aucun dosage des anti-HBs, ni rappel vaccinal ne sont nécessaires.

** Immunoglobulines anti-VHB: HBIG adultes: 800 U/l (12 U/kg) IM dans la fesse jusqu'à 72h maximum. (Avis garde VIH au 0795534656 ou gastroentérologique avant administration)