


# Sédation procédurale au SAUP: Stratification du risque et protocole de jeûne



**Algorithme de stratification de risque et guide de jeûne.** Notes: (1) Définitions suggérées pour une obésité modérée: indice de masse corporelle (IMC) de 30 à 39 kg.m<sup>2</sup> chez les adultes ou du 85<sup>e</sup> au 95<sup>e</sup> centile d'IMC en fonction de l'âge/sexes de l'enfant. Obésité sévère: IMC de 40 kg.m<sup>2</sup> ou plus chez un adulte ou au 95<sup>e</sup> centile ou plus chez un enfant. (2) Inclut la micrognathie, la macroglossie et la laryngomalacie; (3) Inclut la gastroparésie, achalasie, atrésie, rétrécissement et fistule trachéo-œsophagienne; (4) Inclut l'iléus, la pseudo-obstruction, la sténose du pylore et l'invagination. (5) Les liquides clairs sont généralement considérés comme comprenant de l'eau, des jus de fruits sans pulpe, du thé clair, du café noir et des liquides contenant des glucides spécialement préparés. (6) Les intervalles de jeûne ne sont pas absolus, avec des exceptions autorisées lorsque les volumes de prise orale sont mineurs ou que le temps de jeûne est raisonnablement proche. *Traduit de l'anglais par Cyril Sahyoun, MD de Green et al. An international multidisciplinary consensus statement on fasting before procedural sedation in adults and children. Anaesthesia. 2020 Mar;75(3):374-385.*

**Définition de procédures urgentes et ultra-urgentes:** incision et drainage d'abcès, ponction lombaire, suture de plaie, soin de plaie contaminée, extraction de corps étranger, réduction de fracture et de dislocation, ponction articulaire, imagerie, cardioversion, pose de drain thoracique, pose de voie centrale, cathétérisme cardiaque et endoscopie supérieure. *Traduit de l'anglais par Cyril Sahyoun, MD de Green et al. Unscheduled Procedural Sedation: A Multidisciplinary Consensus Practice Guideline. Ann Emerg Med. 2019 May;73(5):e51-e65*