

# Échelle de Tri : Maladie

Niveau du triage	1 (réanimation)	2 (très urgent)	3 (urgent)	4 (semi-urgent)	5 (non urgent)	
<b>Cardio-Vasculaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt cardiaque ou arrêt imminent</li> <li>État de choc</li> <li>Hypotension sévère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bradycardie</li> <li>Pt avec ATCD cardiaques et dir thoracique</li> <li>Tachycardie Pt &lt; 1an bpm &gt; 220 Pt &gt; 1an bpm &gt; 180</li> <li>Tétralogie de Fallot décompensée</li> <li>TSV active</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arythmie stable</li> <li>ATCD cardiaque et EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur thoracique avec sv normaux</li> <li>Épisode de palpitation dans les 24 h</li> </ul>		
<b>Endocrinologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabétique avec altération du GCS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabétique avec acidocétose ou hypoglycémie</li> <li>Diabétique avec V - D</li> <li>V ou EF chez insuffisance surrénalienne ou maladie métabolique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyperglycémie chez diabétique</li> <li>Hypoglycémie résolue</li> </ul>			
<b>Gastro-Entérologie</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Déshydratation sévère</li> <li>Doul abdominale &gt; 7, pt &lt; 2ans</li> <li>Hémorragie active haute ou basse</li> <li>Suspicion de péritonite</li> <li>Suspicion d'hernie non réductible</li> <li>Suspicion d'invagination</li> <li>V en jet chez BB &lt; 1 mois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton de gastrostomie retiré</li> <li>Déshydratation légère à modérée</li> <li>Hernie réductible</li> <li>Suspicion d'APP</li> <li>V persistants ou bilieux</li> <li>V-D aigus pt &lt; 2 ans ou mauvais EG</li> <li>V-D chez Pt avec maladie inflammatoire de l'intestin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton de gastrostomie avec fuite</li> <li>Constipation avec douleur</li> <li>Difficulté avec allaitement</li> <li>Doul abdominale avec bon BEG</li> <li>Écoulement, rougeur ombilic</li> <li>Rectorragie BEG</li> <li>Retard pondéral</li> <li>SNG à réinstaller</li> <li>Troubles de l'alimentation</li> <li>V ses ATB / médicaments</li> <li>V-D aigus pt &gt; 2 ans, BEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parasites</li> <li>Régurgitations</li> <li>Symptômes isolés de V et doul abdo</li> <li>V-D sans douleur ni déshydratation sv normaux</li> </ul>	
<b>Géni-Urologie</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur testiculaire sévère</li> <li>Paraphimosis</li> <li>Priapisme</li> <li>Rétention urinaire &gt; 24h</li> <li>Syndrome néphrotique EF et/ou décompensé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doul abdo avec ATCD gynéco</li> <li>Doul testiculaire modérée ou œdème</li> <li>Rétention urinaire &gt; 8h</li> <li>Symptômes urinaires avec EF ou chez pt avec ATCD IU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hématurie sans EF / sans trauma</li> <li>Masse testiculaire indolore</li> <li>Œdème du pénis et /ou écoulement</li> <li>Possibilité IU sans EF</li> <li>Sonde urinaire à réinstaller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vulvite</li> </ul>	
<b>Gynécologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hémorragie vaginale pt instable (sv anormaux)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grossesse avec doul abdo aigue</li> <li>Hémorragie vaginale active</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hémorragie vaginale avec sv normaux</li> <li>Masse au sein avec EF</li> <li>Pertes vaginales anormales avec EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masse au sein ou écoulement sans EF</li> <li>Règles douloureuses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masse ou écoulement mammaire BB &lt; 1 mois</li> </ul>	
<b>Hématologie-Immunologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choc (anaphylactique), allergie stade 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crise d'anémie falciforme avec EF et/ou doul &gt; 5</li> <li>EF chez pt neutropénique / immunosupprimé</li> <li>Éruption purpurique ou pétéchiale sans EF</li> <li>Hyperbil / ictère du nouveau-né (dyspnée, déshydratation)</li> <li>Pt qui a utilisé l'épipen</li> <li>Réaction allergique stade 3</li> <li>Troubles de l'hémostase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crise d'anémie falciforme sans EF doul &lt; 5</li> <li>Réaction allergique stade 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyperbili / ictère du nouveau-né, BEG</li> <li>Réaction allergique stade 1</li> <li>Urticaire</li> </ul>		

# Échelle de Tri : Maladie

Niveau du triage	1 (réanimation)	2 (très urgent)	3 (urgent)	4 (semi-urgent)	5 (non urgent)
<b>Infection EF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Choc (septique)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BB &lt; 3 mois avec T° ≤ 36° ou ≥ 38°</li> <li>EF et mauvais EG</li> <li>Purpura avec EF</li> <li>Fontanelle bombée</li> <li>Raideur de la nuque avec EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BB de 3 à 6 mois avec EF</li> <li>Cellulite avec EF</li> <li>EF &gt; 3j sans foyer</li> <li>EF avec signes d'infection d'une voie centrale</li> <li>EF et EG moyen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cellulite localisée sans EF</li> <li>Pt &gt; 6 mois avec EF et BEG</li> <li>Myalgie et EF</li> <li>Problème de voie centrale sans EF</li> <li>Repose de voie-veineuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Injection ATB avec BEG sans consultation médicale</li> </ul>
<b>Maltraitance</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pt à risque immédiat de maltraitance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abus physique ou sexuel &lt; 48h</li> <li>Agression physique</li> <li>Histoire inappropriée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abus physique ou sexuel &gt; 48h</li> <li>Histoire ou signes de violence familiale</li> </ul>	
<b>Musculo-Squelettique</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiterie avec EF</li> <li>Doul/œdème articulaire avec EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiterie sans EF</li> <li>Douleur sans notion de trauma</li> <li>Œdème d'une extrémité sans EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur diffuse aux jambes sans EF ou boiterie</li> <li>Lombalgie chronique</li> </ul>
<b>Neurologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convulsion active</li> <li>GCS &lt; ± 10</li> <li>Inconscience ou absence de réaction</li> <li>Modification des pupilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altération de l'état de conscience ou GSC11-13</li> <li>Céphalée &gt; 7</li> <li>Confusion aiguë</li> <li>Malaise instable</li> <li>Pt avec drain ventriculo-péritonéal, céphalées ou V ou modification de l'EG/GSC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altération de l'état de conscience dans l'anamnèse, GCS 15</li> <li>Céphalée 4-7</li> <li>Convulsion avant l'arrivée / état post critique</li> <li>Malaise stable</li> <li>Nourrisson inconsolable</li> <li>Paresthésie ou hyperesthésie / perte d'équilibre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Céphalée chronique dir 4-7/10</li> <li>Comportement anormal</li> <li>Pt irritable, consolable</li> </ul>	
<b>O.R.L. Ophtalmo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dysphagie avec hyper salivation ou dyspnée (stridor)</li> <li>Épistaxis non contrôlé</li> <li>Hémorragie non contrôlée post-amygdalectomie /adénoïdectomie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adénopathie cervicale avec EF</li> <li>Cellulite périorbitaire avec EF</li> <li>Changement brusque de la vision</li> <li>Décollement du pavillon de l'oreille (mastoidite)</li> <li>Doul dentaire 8-10 (abcès)</li> <li>Épistaxis &gt; 20min</li> <li>Saignement contrôlé post-amygdalectomie ou adénoïdectomie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adénopathie cervicale sans EF</li> <li>Cellulite périorbitaire sans EF</li> <li>Doul dentaire 4-7</li> <li>Lésions buccales doul &gt; 5</li> <li>Mal de gorge doul &gt;5</li> <li>Otalgie doul &gt;5</li> <li>Sécrétions oculaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Congestion nasale</li> <li>Histoire d'épistaxis</li> <li>Lésions buccales doul &lt; 5</li> <li>Maux gorge doul &lt; 5</li> <li>Muguet</li> <li>Otalgie doul &lt; 5</li> </ul>
<b>Peau Cutané Dermato</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Éruption chronique avec détérioration</li> <li>Urticaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éruption chronique et stable</li> <li>Éruption locale</li> <li>Érythème fessier</li> <li>Poux, Tique, parasites</li> </ul>
<b>Psychiatrie</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Agitation aiguë</li> <li>Comportement violent</li> <li>Hallucination</li> <li>Haut risque pour lui-même ou autrui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportement perturbateur</li> <li>Détresse psychologique</li> <li>Épuisement parental</li> <li>Risque modéré pour lui-même ou autrui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépression</li> <li>Faible risque pour lui-même ou autrui</li> <li>Problèmes de comportement et/ou d'adaptation sociale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placement social</li> </ul>
<b>Respiratoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêt respiratoire ou arrêt imminent</li> <li>Compromis des voies respiratoires</li> <li>Détresse respiratoire avec hyper salivation et dysphagie</li> <li>Détresse respiratoire sévère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détresse respiratoire modérée</li> <li>Histoire d'apnée BB &lt; 2 mois</li> <li>Hyper salivation et dysphagie</li> <li>Problème avec canule de trachéo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détresse respiratoire légère</li> <li>Histoire d'apnée pt &lt; 1 an</li> <li>Toux constante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Histoire d'étouffement sans dyspnée</li> <li>Toux épisodique</li> <li>Toux ou voix rauque sans stridor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toux à l'effort ou nocturne</li> </ul>

Abréviations							
APP	Appendicite	D	Diarrhées	IU	Infection Urinaire	TC	Traumatisme Crânien
ATB	Antibiotique	doul	douleur	Pt	Patient	TSV	Tachycardie Supra-Ventriculaire
ATCD	Antécédents	EF	État fébrile	SDR	Syndrome Détresse Respiratoire	V	Vomissements
BB	Bébé	EG / BEG	État Général / Bon État Général	SNG	Sonde Naso-Gastrique	PC	Perte de Connaissance
CE	Corps Étranger	GCS	Glasgow	sv	Signes Vitaux	Bpm	Battement par minute

Niveau du triage	1 (réanimation)	2 (très urgent)	3 (urgent)	4 (semi-urgent)	5 (non urgent)
<b>Cardio-Vasculaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hémorragie massive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrisation avec trouble du rythme</li> <li>Hémorragie majeure non contrôlée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Électrisation mineure</li> <li>Hémorragie mineure non contrôlée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trauma thoracique avec sv normaux</li> </ul>	
<b>Gastro-Entérologie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traumatisme abdominal contondant pénétrant, avec signes anormaux ou symptômes de choc</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorption CE toxique (pile)</li> <li>Trauma abdominal avec dou, sv normaux, abdomen souple</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorption CE</li> </ul>	
<b>Génito Néphro-Urologie</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hématurie suite à un trauma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trauma loge rénale</li> <li>Trauma scrotal</li> </ul>		
<b>Gynécologie</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaies vaginales</li> <li>Suspicion de viol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE vaginal ou rectal</li> </ul>	
<b>Infection EF</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Piqûre d'aiguille contaminée &lt; 24h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piqûre d'aiguille contaminée &gt; 24 h</li> </ul>	
<b>Intoxication</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Intoxication potentiellement dangereuse (risque neuro, resp, cardio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intoxication nécessitant une surveillance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intoxication bénigne</li> </ul>	
<b>Musculo-squelettique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polytraumatisé</li> <li>Amputation d'une extrémité (main, bras, pied, jambe)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amputation d'un doigt ou orteil</li> <li>Doul/trauma chez pt avec problème d'hémostase</li> <li>Doul/trauma vertébral avec déficit neuro</li> <li>Fracture ouverte ou atteinte neuro-vasc</li> <li>Luxation</li> <li>Trauma haute énergie avec sv stables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiterie avec EF</li> <li>Doul/œdème articulaire avec EF</li> <li>Fracture avérée ou probable (œdème / déformation)</li> <li>Plâtre serré avec atteinte neuro-vasculaire</li> <li>Trauma basse énergie (ou pt sur planche et minerve)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boiterie sans EF</li> <li>Possibilité de fracture (sans déformation ou atteinte neuro-vasculaire)</li> <li>Œdème d'une extrémité sans EF</li> <li>Plâtre serré sans atteinte neuro-vasc</li> <li>Trauma / doul vertébral, signes neuro normaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lombalgie chronique</li> <li>Plâtre brisé</li> <li>Trauma asymptomatique</li> </ul>
<b>Neurologique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convulsion active</li> <li>GCS &lt; ± 10</li> <li>Inconscience ou absence de réaction</li> <li>Modification des pupilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altération de l'état de conscience ou GSC11-13</li> <li>Céphalée &gt; 7</li> <li>Confusion aiguë</li> <li>Convulsions post TC</li> <li>TC majeur (otorragie/hémotympan/écoulement LCR nasal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altération de l'état de conscience dans l'anamnèse, GCS 15</li> <li>Céphalée 4-7</li> <li>Convulsion avant l'arrivée / état post critique</li> <li>Paresthésie ou hyperesthésie / perte d'équilibre</li> <li>TC modéré (PC/ amnésie / V &gt;3 ou tardifs)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TC mineur (sans PC, V &lt; 3, GSC 15)</li> </ul>	
<b>O.R.L. Ophtalmo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Amputation ou CE empalé dans l'oreille</li> <li>Ingestion de CE avec hyper salivation</li> <li>Trauma nasal avec difficulté resp</li> <li>Trauma pénétrant ou substance chimique dans l'œil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avulsion d'une dent permanente</li> <li>CE nasal avec douleur, et/ou risque d'aspiration</li> <li>Doul dentaire 8-10</li> <li>Histoire de CE avec dysphagie persistante</li> <li>Surdité brutale</li> <li>Trauma oculaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrasion/CE cornéenne</li> <li>CE dans l'oreille</li> <li>Dent cassée ou branlante</li> <li>Doul dentaire 4-7</li> <li>Trauma nasal sans difficulté respiratoire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avulsion d'une dent de lait</li> </ul>
<b>Peau Cutané Dermato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brûlure de 25% et plus de la surface corporelle ou atteinte des voies resp</li> <li>Hypothermie T° &lt;34°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brûlure &gt; 10% de la surface corporelle, visage, parties génitales, pied ou main</li> <li>Brûlures chimiques ou électriques</li> <li>Brûlures circulaires</li> <li>Hypothermie T°34-36°</li> <li>Lacération chez pt avec problème d'hémostase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brûlure de 1-10% de la surface corporelle</li> <li>Cellulite post plaie avec EF</li> <li>Lacération complexe</li> <li>Morsure transcutanée</li> <li>Plaie infectée avec EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brûlure mineure (&lt; 1% de la surface corporelle)</li> <li>CE cutané</li> <li>Cellulite post plaie sans EF</li> <li>Lacération simple</li> <li>Plaie infectée ou abcès sans EF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrasion</li> <li>Brûlure superficielle</li> <li>Morsure simple</li> <li>Piqûre d'insecte</li> </ul>
<b>Respiratoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traumatisme thoracique avec SDR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration CE avec SDR</li> <li>Dysphagie ou voix enrouée suite à trauma laryngé</li> <li>Inhalation de substance toxique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration CE avec toux mais sans SDR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration de CE sans SDR</li> <li>Traumatisme thoracique sans SDR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité d'aspiration CE</li> </ul>

Abréviations							
APP	Appendicite	D	Diarrhées	IU	Infection Urinaire	TC	Traumatisme Crânien
ATB	Antibiotique	doul	douleur	Pt	Patient	TSV	Tachycardie Supra-Ventriculaire
ATCD	Antécédents	EF	État fébrile	SDR	Syndrome Détresse Respiratoire	V	Vomissements
BB	Bébé	EG / BEG	État Général / Bon État Général	SNG	Sonde Naso-Gastrique	PC	Perte de Connaissance
CE	Corps Étranger	GCS	Glasgow	sv	Signes Vitaux	Bpm	Battement par minute

Paramètres et tailles en fonction de l'âge et/ou du poids de l'enfant										
Age	NN	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	7 ans	10 ans	> 14 ans
Poids (kg)	3	5.5	7	10	12	15	20	25	35	50
Taille (cm)	50	60	70	75	90	95	110	125	140	160
FR/min	40-60	40-60	25-40	20-30	20-30	20-30	20-30	12-25	12-25	12-18
FC/min	90-165	110-185	110-185	110-170	90-150	75-135	65-135	60-125	60-120	60-120
TA systolique (mmHg)	60-80	65-95	65-105		50th	Percentile :	90 mmHg + (2 x âge)	**	**	110-130

Score de Gravité des Allergie (selon HL Muller)	
Stade 1 =	Urticaire, malaise, anxiété
Stade 2 =	Stade 1 + Douleur abdo, nausées, diarrhées, vertiges
Stade 3 =	Stade 2 + Dyspnée, dysphagie, dysphonie, confusion, angoisse de mort
Stade 4 =	Stade 3 + Cyanose, hypotension, collapsus, syncope, incontinence

Glasgow Coma Scale (GCS)	
<b>Ouverture des yeux</b>	
Spontanée	4
A l'appel	3
A la douleur	2
Aucune	1
<b>Réponse Verbale</b>	
Orientée ( <i>sourit, babille</i> )	5
Confuse ( <i>pleurs mais consolable</i> )	4
Mots inappropriés ( <i>cris, pleurs</i> )	3
Sons incohérents ( <i>gémissements</i> )	2
Aucune	1
<b>Réponse motrice</b>	
Obéit ( <i>bouge normalement</i> )	6
Localise douleur ( <i>retrait au toucher</i> )	5
Retrait en flexion ( <i>retrait si douleur</i> )	4
Flexion stéréotypée	3
Extension stéréotypée	2
Aucune ( <i>enfants &lt; 2 ans</i> )	1

Degré de déshydratation			
Perte pondérale = paramètre le plus fiable.			
Si incertaine, estimer sur la base des signes suivants :			
	5% légère	10% modérée	15% sévère
Muqueuses sèches	+	+	++
Fontanelle déprimée	-	+	++
Absence de larmes	-	+	++
Diminution turgor cutané	-	+	+
Hypotonie globes oculaires	-	+	++
Tension artérielle	N	N↓	↓
Fréquence cardiaque	N↑	↑	↑↑
Diurèse	↓	↓↓	↓↓↓

Degré de gravité d'une bronchiolite aiguë			
	léger	moyen	sévère
Fréquence resp	< 40/min.	40 - 70/min	> 70min
SaO2 (AA)	> 92%	88 - 92 %	> 88 %
Tirage (sternal/thoracique)	Absent	+	++
Alimentation	sans problème	difficile	impossible

Choc	
Signes précoces	Signes tardifs
<ul style="list-style-type: none"> <li>tachycardie</li> <li>tachypnée (grunting)</li> <li>extrémités clampées</li> <li>oligurie</li> <li>agitation</li> </ul>	<b>Signes précoces +</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pouls faibles</li> <li>hypotension</li> <li>oligo-anurie</li> <li>altération de l'état de conscience</li> </ul>

Crise d'asthme / dyspnée (Enfants < 2 ans)		
Crise légère	Crise modérée	Crise sévère, risque vital
<ul style="list-style-type: none"> <li>SaO2 ≥ 92%</li> <li>Dit des phrases</li> <li>Alimentation conservée</li> <li>Sifflements variables</li> <li>FC &lt; 100/min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SaO2 &lt; 92 %</li> <li>Ne dit que quelques mots</li> <li>Alimentation difficile</li> <li>Sifflements marqués</li> <li>Tirage modéré, utilisation des muscles accessoires</li> <li>FC 100 - 200/min</li> <li>FR &gt; 50/min, enfant &lt; 5ans</li> <li>FR &gt; 30/min, enfant &gt; 5ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SaO2 &lt; 92 %</li> <li>Incapable de parler</li> <li>Alimentation impossible</li> <li>Silent chest, tendance aux apnées, épuisement</li> <li>Tirage marqué, utilisation des muscles accessoires</li> <li>FC &gt; 200/min</li> <li>Pouls paradoxal</li> <li>Altération de l'état de conscience, agité ou léthargique</li> <li>Cyanose centrale</li> </ul>