

## ORDRES DE JEUNE POUR INTERVENTIONS ÉLECTIVES

Aliments solides Lait en poudre	Lait maternel Lait 1 <sup>er</sup> âge	Liquides clairs
6 heures	4 heures	1 heure

### LIQUIDES CLAIRS

- Les Sociétés Savantes Européennes ainsi que la Société Suisse d'Anesthésie Pédiatrique recommandent que tous les enfants âgés de 0 à 16 ans soient autorisés et même encouragés de prendre jusqu'à une heure avant une intervention électorive des liquides clairs.
- **Le volume maximum recommandé est de 3 ml/kg**

### LE LIQUIDE CLAIR EST DEFINI COMME SUIV

- Eau, sirop de fruit, jus de fruit sans pulpe (pomme, ...), boissons isotoniques aromatisées mais non-gazeuses
- Boissons non gazeuses et non épaissies

### CONTRE-INDICATIONS A LA PRISE DE LIQUIDES CLAIRS

- Reflux gastro-oesophagien
- Insuffisance rénale
- Insuffisant moteur cérébral
- Entéropathies
- Sténoses oesophagiennes
- Achalasie
- Diabète avec gastroparésie
- **Contre-indication chirurgicale : toute obstruction du tractus intestinal**