

Mesures spécifiques et isolements au SAUP

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques

Responsable du document : Kevin HADDAD

Mise à jour
21.02.2023**SOS SPCI : 30 989****Nettoyeur : 31 944**

[Varicelle \(avérée ou suspicion\)](#)

Rappel

Mode de transmission : [Air](#) – [Contact](#)

Incubation : La période d'incubation est de 14 à 16 jours en moyenne et peut aller parfois jusqu'à trois semaines.

Contagiosité : Débute 5 jours avant l'apparition des vésicules / et dure jusqu'à la disparition de la dernière croûte

Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croûte

- [Varicelle : directive HUG - PCI](#) (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
- Si possible directement dans un Box sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD)
- Box individuel (**de préférence C1, C2 ou 8** car moins de matériel et de patients à risques)
 - o Portes toujours fermées / Demander au patient de ne pas sortir du box
 - o **Ne jamais installer** au LHCD
 - o Nettoyer les surfaces en zone d'attente



- **Mesures spécifiques "[AIR](#)" et "[CONTACT](#)"**

- o Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box
- o Gants non stériles et surblouse pour tout contact avec le patient

- **Masque ultra-filtrant FFP2 pour le personnel et les visiteurs adultes**

- **Si hors SAUP (ex : Rx – hospitalisation – cafétéria) : masque soins pour le patient (Masque ultrafiltrant pédiatrique non disponible)**

Départ du patient

- o Évacuation des déchets, linge : normal
- o Le plateau repas est sorti de la chambre et déposé directement dans le chariot à destination de la cuisine centrale.
- o Entretien box et matériel : au départ du patient selon les directives de base pour le nettoyage aux HUG

[Tuberculose \(avérée ou suspicion\) pulmonaire foyer ouvert](#)

Isolement

- [Tuberculose HUG – PCI](#) (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
- **Masque ultra-filtrant FFP2 pour le personnel et les visiteurs adultes**
- Masque de soins pour le patient (Masque ultrafiltrant pédiatrique non disponible)
- Directement dans un box individuel (box 1 à 5)
 - o **Pression négative** (bouton sur N°2)
 - o Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box
 - o **Ne jamais installer** au LHCD
 - o **Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel du box 10)**
- **Mesures spécifiques "[AIR](#)"**
 - o Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box



Mesures spécifiques et isolements au SAUP

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques

Responsable du document : Kevin HADDAD

Mise à jour
21.02.2023

Départ du patient

- **Box : fermé pendant 60 min** avec fenêtre fermée.
 - o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue
- **Nettoyage du box : tel 31 946** (semaine de 6h à 21h) (week-end/fériés 31 944), (si pas de réponse : 31 962).
- Tout professionnel entrant dans le lieu à désinfecter revêt l'équipement de protection relatif à la Mesure spécifique qui s'applique, jusqu'à ce que la présente procédure soit entièrement achevée
 - o **Préciser que c'est une procédure code rouge : indiquer pour quelle pathologie (Tuberculose) et quel produit utiliser (TRISTEL FUSE for SURFACE)**
 - o Désinfection et bio-nettoyage par collaborateurs SPH et l'équipe soignante
 - o Le bionettoyage de toutes les surfaces horizontales, des surfaces verticales jusqu'à « hauteur d'homme » par application du TRISTEL FUSE for SURFACE et le nettoyage des vitres
 - o Matériel : désinfection avec TRISTEL FUSE for SURFACE (Vidoir)
- **Évacuation de tous les déchets** : Filière des déchets infectieux (sac et bidon jaune) **Sac à poubelle jaune.**
- Évacuation du linge : filière habituelle : Sac à linge normal, mais le **sac** doit être **fermé** immédiatement, même si pas plein.
- Le plateau repas est sorti de la chambre et déposé directement dans le chariot à destination de la cuisine centrale.

Levée de la Mesure spécifique

La signalisation de la Mesure spécifique est retirée à la fin de la désinfection de l'environnement par le dernier collaborateur intervenant dans la procédure

Coqueluche



- **Prévention de la transmission** : "CONTACT" et "GOUTTELETTES".
Isolement en chambre individuelle.
- Protocole de nettoyage entretien de base

Rougeole

Cas suspects :

- enfant NON vacciné AVEC rash Et conjonctivite ET fièvre.
- enfant NON vacciné, ET rash ou conjonctivite ou fièvre, ET contact avec cas confirmé de rougeole.

Isolement : Suspicion ou cas avéré : "AIR" en complément des Mesures de base



- Dès le tri : **masque ultra-filtrant type FFP2 pour le personnel** en permanence (nez et bouche), masque soins pour le patient (Masque ultrafiltrant pédiatrique non disponible)
- Installer directement dans un box à pression négative (1 à 5)
- **Ne jamais installer** au LHCD.

Départ du patient

- Entretien de la chambre au départ du patient selon les directives de base pour le nettoyage aux HUG
- L'évacuation du linge suit la filière standard de la centrale de traitement du linge HUG directement à la sortie de la chambre
- Le plateau repas est sorti de la chambre et déposé directement dans le chariot à destination de la cuisine centrale.
- Au départ du patient, pas de réadmission d'un autre patient **pendant 60 min**

Mesures spécifiques et isolements au SAUP

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques

Responsable du document : Kevin HADDAD

Mise à jour
21.02.2023

Dépistage BMR

Concerné

- **Patient transféré d'un établissement de soins** (Suisse ou étranger) ou ayant eu une histoire médicale à l'étranger au cours des 12 derniers mois. *Patient ayant séjourné dans le sous-continent indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka)*
Patient réfugié Ukraine, Russie...
- **Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire**, en provenance de l'étranger ou de Suisse (Terre des hommes par exemple).



Mesures spécifiques "CONTACT" Mettre **étiquettes d'isolement Contact** sur la porte du box


- o **Gants non stériles** pour tout contact avec le patient
- o **Surbblouse** pour tout contact avec le patient



Si alerte BMR "CONTACT PLUS": Nettoyage du box (**BN : bio nettoyage** avec "TRISTEL FUSE") : jusqu'à 21h tel nettoyeur 31 946. Après 21h si nettoyage par l'équipe pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage.

Examens

- OrderSet du service : SAUP: BMR Dépistage (ou ordre à bouton).
- Si patient RAD mais va revenir : faire les prélèvements. Si patient hospitalisé, les prélèvements font partie du bilan d'admission.

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 4 sur 4
	Approbateur : Isabelle GOLARD	Version n°1
Mesures spécifiques et isolements au SAUP		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 21.02.2023

[La Gale](#)

Mode de transmission

Se fait par contact direct (plus rarement par contact indirect avec des vêtements/literies contaminés). La gale est aussi considérée comme maladie sexuellement transmissible.

Durée d'incubation

Entre deux et six semaines. Cette période est réduite d'un à quatre jours en cas de ré-infestation.

Prévention de la transmission

- [Mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications – *Intranet/VigiGerme®/Mesures de base*.
- Le professionnel **se lave les mains au savon et à l'eau** en quittant le patient (la friction hydro-alcoolique n'est pas scabicide).

En complément, appliquer les mesures spécifiques "[CONTACT](#)" pendant les 24 heures qui suivent l'initiation du traitement oral.

[Les Poux](#)

L'infestation se fait par contact direct et indirect (literie, linges de toilettes, vêtements, articles de coiffure, etc.).

Prévention de la transmission : [mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications.

Évacuation du linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein.

[Punaises de lit](#)

Prévention de la transmission

- Isolement en chambre individuelle. Isoler les affaires personnelles dans un sac fermé.
- Application des [mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications.
- Linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein.
- Si insecte vu merci de l'attraper dans un contenant hermétique pour le transmettre au service Hygiène et propreté