 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 1 sur 3
	Approbateur : Isabelle GOLARD	Version n°1
<h2>Mesures spécifiques et isolements au SAUP</h2>		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 20.06.2019

Varicelle (avérée ou suspicion)

SOS SPCI : 30 989
Nettoyeur : 31 944

Rappel

- Mode de transmission : [Air](#) – [Contact](#)
- Incubation : La période d'incubation est de 14 à 16 jours en moyenne et peut aller parfois jusqu'à trois semaines.
- Contagiosité :
 - o Début : 5 jours avant l'apparition des vésicules / Durée : jusqu'à la disparition de la dernière croûte

Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croûte

- [Varicelle : directive HUG - PCI](#) (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
- Si possible directement dans un Box sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD)
- Box individuel (**de préférence C1, C2 ou 8** car moins de matériel et de patients à risques)
 - o Portes toujours fermées / Demander au patient de ne pas sortir du box
 - o **Ne jamais installer** à LHCD
 - o Nettoyer les surfaces en zone d'attente
- **Mesures spécifiques "[AIR](#)" et "[CONTACT](#)"**
 - o Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box
 - o Gants non stériles et surblouse pour tout contact avec le patient
 - o Masque ultra-filtrant FFP2 si le soignant n'a jamais eu la varicelle
- **Si hors SAUP (ex : Rx – hospitalisation – cafétéria) : patient avec Masque ultra-filtrant FFP2**


Départ du patient

- Box : **fermé pendant 30 min**
 - o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue
 - o Si besoin du box plus rapidement, voir avec CdC tri tel 34 824
 - o **Toujours laisser les portes du box fermées**
 - o Évacuation des déchets / plateau / linge : normal
 - o Entretien box et matériel : normal (entretien de base)

Tuberculose (avérée ou suspicion)

Isolement

- [Tuberculose HUG – PCI](#) (Service Prévention et Contrôle de l'Infection)
- **Masque ultra-filtrant FFP2**
- Directement dans un box individuel (box 1 à 5)
 - o **Pression négative (bouton sur N°2)**
 - o Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box
 - o **Ne jamais installer** à LHCD
 - o **Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel du box 10)**
- **Mesures spécifiques "[AIR](#)"**
 - o Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 2 sur 3
	Approbateur : Isabelle GOLARD	Version n°1
Mesures spécifiques et isolements au SAUP		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 20.06.2019

Départ du patient

- **Box : fermé pendant 60 min** avec fenêtre fermée.
 - o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue
- **Nettoyage du box : tel 31 946** (semaine de 6h à 21h) (week-end/fériés 31 944) (si pas de réponse : 31 962).
 - o **Préciser que c'est une procédure code rouge : indiquer pour quelle pathologie (Tuberculose) et quel produit utiliser (Dismozon 0.4%)**
 - o Désinfection et bio-nettoyage par collaborateurs SPH et l'équipe soignante
 - o Dismozon 0.4% sur toutes les surfaces et équipement. Et sur les surfaces verticales jusqu'à "hauteur d'homme".
 - o Matériel : désinfection avec Disomozon 0.4%
- Évacuation des déchets : Filière des déchets infectieux (sac et bidon jaune) **Sac à poubelle jaune.**
- Évacuation du linge : filière habituelle : Sac à linge normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein. Évacuation des plateaux repas : Filière normale.

Coqueluche → la coqueluche

- **Prévention de la transmission** : "CONTACT" et "GOUTTELETTES". Isolement en chambre individuelle.

Rougeole → la rougeole

- Cas suspects** :
- enfant NON vacciné AVEC rash Et conjonctivite ET fièvre.
 - enfant NON vacciné ET rash ou conjonctivite ou fièvre ET contact avec cas confirmé de rougeole.

Isolement : Suspicion ou cas avéré : "AIR" en complément des Mesures de base

- Dès le tri : **masque ultra-filtrant type FFP2** en permanence (nez et bouche).
- Si possible directement dans un box sinon salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté de LHCD).
- **Ne jamais installer** à LHCD.


Départ du patient

- Nettoyage du box (BN : bio nettoyage) : jusqu'à 21h tel nettoyeur 31 946. Après 21h faire le nettoyage du box avec "TRISTEL FUSE". si pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage
- **Box : fermé pendant 1 heure**. Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue.

Dépistage BMR → Dépistage BMR

Concerné

- **Patient transféré d'un établissement de soins** (Suisse ou étranger) ou ayant eu une histoire médicale à l'étranger au cours des 12 derniers mois. *Patient ayant séjourné dans le sous-continent indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka).*
- **Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire**, en provenance de l'étranger ou de Suisse (Terre des hommes par exemple).

 Hôpitaux Universitaires Genève	Type de document Catégorie procédurale – procédure HUG	Page 3 sur 3
	Approbateur : Isabelle GOLARD	Version n°1
Mesures spécifiques et isolements au SAUP		
DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 20.06.2019

Mesures spécifiques "CONTACT" Mettre **étiquettes d'isolement Contact plus** sur la porte du box

- **Gants** non stériles pour tout contact avec le patient
- **Surblouse** pour tout contact avec le patient

VRE, CPE, Acinetobacter, Norovirus, Clostridium difficile "CONTACT PLUS": Nettoyage du box ([BN : bio nettoyage](#) avec "TRISTEL FUSE") : jusqu'à 21h tel nettoyeur 31 946. Après 21h si nettoyage par l'équipe pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage.

Examens

- OrderSet du service : SAUP: BMR Dépistage (ou ordre à bouton).
- Si patient RAD mais va revenir : faire les prélèvements. Si patient hospitalisé, les prélèvements font partie du bilan d'admission.

La Gale → la gale

Mode de transmission

Se fait par contact direct (plus rarement par contact indirect avec des vêtements/literies contaminés). La gale est aussi considérée comme maladie sexuellement transmissible.

Durée d'incubation

Entre deux et six semaines. Cette période est réduite d'un à quatre jours en cas de ré-infestation.

Prévention de la transmission

- [Mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications – *Intranet/VigiGerme®/Mesures de base*.
- Le professionnel **se lave les mains au savon et à l'eau** en quittant le patient (la friction hydro-alcoolique n'est pas scabicide).

En complément, appliquer les mesures spécifiques "[CONTACT](#)" pendant les 24 heures qui suivent l'initiation du traitement oral.

Les Poux → les poux

L'infestation se fait par contact direct et indirect (literie, linges de toilettes, vêtements, articles de coiffure, etc.).

Prévention de la transmission : [mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications.

Évacuation du linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein.

Punaises de lit → les punaises de lit

Prévention de la transmission

- Isolement en chambre individuelle. Isoler les affaires personnelles dans un sac fermé.
- Application des [mesures de base](#), dont l'hygiène des mains, selon leurs indications.
- Linge : filière habituelle normal, mais le sac doit être fermé immédiatement, même si pas plein.