

Prise en charge au DEA d'un enfant venant de l'étranger

- Enfants en provenance de l'étranger organisé par « Terre des Hommes » ou par une autre organisation caritative
- Enfants en provenance d'un pays étranger (Afrique, Asie, Amérique, Europe de l'est, Arabie...) ou d'un hôpital étranger

Protocole de dépistage microbiologique :

- **Frottis pool MRSA** (laboratoire de bactériologie) :
 - ✓ un écouvillon* pour les deux plis inguinaux
 - ✓ un écouvillon* pour les deux narines

Requête :

➤ **OrderSet (modèles)** ➤ **Frottis pool MRSA : admission**

- **Frottis anal** (laboratoire de bactériologie) :
 - ✓ un seul écouvillon*

Requête :

➤ **Laboratoires** ➤ **Bactériologie** ➤ **Contrôle des infections** ➤ **Frottis anal**

Demander :

- *Acinetobacter baumannii* multi-résistant
- *Enterobactéries BLSE*
- *Entérocoques VRE*
- *Gram négatives résistantes aux carbapénèmes*

FROTTIS ANAL

- ☒ Acinetobacters multi-résistants (Culture)
- ☒ Entérobactéries BLSE (Culture)
- ☒ Entérocoques VRE (Culture)
- ☒ Gram-négatives résistantes aux carbapénèmes (Culture, PCR)
- ☐ Candida (Culture)
- ☐ MRSA Exclusivement (Culture)
- ☐ Recherche *S. aureus* (Culture)
- ☐ Suspicion épidémie (Culture)
- ☐ Toxines (Culture, PCR)

*** Les écouvillons sont toujours humidifiés au préalable avec du NaCl 0,9% stérile**

Mesures VigiGerme® A instaurer dès l'entrée.

- Mesure Spécifique « Contact » dans toutes les unités.
- Mesure de Base dès réception des résultats bactériologiques négatifs.
- Pour les enfants « Alerte » connus porteurs de BMR (Bactérie Multi résistante) aux HUG, la mesure spécifique « Contact » est instaurée et les prélèvements d'entrée doivent être effectués.

La suite de la prise en charge sera vue avec l'infirmière SPCI référente Natel 33488