Médicaments pouvant être administrés au SAUP avant accord médical

DFEA - Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 15.09.2025

Molécule/Famille d'antalgie — POSOLOGIE et PRÉSENTATION

PARACETAMOL

Max adulte : 1 g x 4 / j

P.O. : 15 mg / kg / dose (4x / j)

I.R : 20 mg / kg / dose (4x / j)

DAFALGAN® sirop P.O. 30 mg / 1 ml		
2 kg	30 mg	1 ml
4 kg	60 mg	2 ml
6 kg	90 mg	3 ml
8 kg	120 mg	4 ml
10 kg	150 mg	5 ml
12 kg	180 mg	6 ml
14 kg	210 mg	7 ml
16 kg	240 mg	8 ml

DAFALGAN® suppo	
4 kg	80 mg
7.5 kg	150 mg
15 kg	300 mg
30 kg	600 mg

ATTENTION :

Première dose possible P.O. :
dosage = **20 mg / kg / dose**

Si enfant **déjà sous paracétamol** :
dosage = **15 mg / kg / dose**

DAFALGAN® Comprimés > 33 KG = 500 MG

A.I.N.S > 3 mois

IBUPROFEN

Dose : 10 mg / kg (3x / jour)

Max adulte : 3x 600 mg / jour

ALGIFOR® sirop 100 mg / 5 ml		
4 kg **(> 3 mois !)**	40 mg	2 ml
6 kg	60 mg	3 ml
8 kg	80 mg	4 ml
10 kg	100 mg	5 ml
12 kg	120 mg	6 ml
14 kg	140 mg	7 ml
16 kg	160 mg	8 ml
20 kg	200 mg	10 ml
30 kg	300 mg	15 ml
40 kg	400 mg	20 ml

IRFEN® Comprimés		
≥ 20 kg = 200 mg	≥ 40 kg = 400 mg	≥ 60 kg = 600 mg

ACIDE MÉFÉNAMIQUE

P.O. : 6.5 mg / kg / dose (3x / j)

I.R. : 12 mg / kg / dose (3x / j)

MEFENACID® Comprimés	
≥ 40 kg = 250 mg	≥ 70 kg = 500 mg

MEFENACID® suppo
≥ 10 kg = 125 mg

OPIACES

TRAMADOL > 2 ans

P.O. : 2 mg / kg / dose
Max : 100 mg / dose

TRAMAL® gouttes 100 mg / 1 ml (prélever avec seringue de 1 ml)		
7-12 kg	< 2 ans	Sur O.M.
15 kg	30 mg	0.3 ml
20 kg	40 mg	0.4 ml
25 kg	50 mg	0.5 ml
30 kg	60 mg	0.6 ml

35 kg	70 mg	0.7 ml
40 kg	80 mg	0.8 ml
45 kg	90 mg	0.9 ml
≥ 50 kg	100 mg	1 ml

Médicaments pouvant être administrés au SAUP avant accord médical

Antiémétique — Zofran® / Ondansetronum

Indications : Vomissements incoercibles ou nausées empêchant la réhydratation

Contre-indications :
- < 6 mois (voir CdC)
- Antécédents de problème cardiaque
- Troubles électrolytiques

Dose :
- Sirop : 4 mg = 5 ml
- 0.2 mg / kg (max 8 mg / dose, 3x / jour)
- Orodispersible TEVA 4 mg ≥ 20 kg

Poids	mg	ml
6 kg	1.2 mg	1.5 ml
8 kg	1.6 mg	2 ml
10 kg	2 mg	2.5 ml
12 kg	2.4 mg	3 ml
15 kg	3 mg	3.8 ml
≥ 20 kg	4 mg	5 ml ou 1 cpr

Antihistaminique — Cétirizine

Attention : si atteinte néphrologique : voir avec CdC

Dose :< 6 mois → sur O.M.
P.O. : 0.25 mg / kg / dose (2x / jour)

Dilution : gouttes : 10 mg = 1 ml = 20 gouttes

Poids	mg	Gouttes
< 6 mois	Sur O.M.	
7 à 10 kg	2.5 mg	5 gouttes
> 10 à 20 kg	5 mg	10 gouttes
> 20 kg	10 mg	20 gouttes ou 1 cpr

Corticoïde — Dexaméthasone

Indications : Faux-croup

Dilution : 0.75 mg / ml

Dose unique : 0.6 mg / kg (**max 16 mg**) 1x 72 h

Dose maximum : **16 mg** = 21.3 ml

Poids	mg	ml
6 kg	3.6 mg	4.8 ml
8 kg	4.8 mg	6.4 ml
10 kg	6 mg	8 ml
12 kg	7.2 mg	9.6 ml
14 kg	8.4 mg	11.2 ml
16 kg	9.6 mg	12.8 ml
18 kg	10.8 mg	14.4 ml
20 kg	12 mg	16 ml
25 kg	15 mg	20 ml
≥ 27 kg	16 mg	21.3 ml

Solution de réhydratation

Préparation : 1 sachet dilué dans 200 ml d'eau à donner une cuillère à café / 5 min
Dose : Enfant : 50 à 100 ml / kg en 4h

FENTANYL intranasal selon le protocole

EMLA selon le protocole