Plaies

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 26/04/2022

Respecter le protocole "Pour accueil et installation"

1. Tri du patient

- Rinçage léger de la plaie à la Chlorhexidine aqueuse sans trop appuyer (Sauf oreille, si doute sur la désinfection Chlorhexidine versus Bétadine, demander au médecin)
- Application Gel LET par saturation de ouate à déposer sur la plaie et son pourtour
- Fermeture par Hypafix et/ou bande non adhésive
- Antalgie orale systématique de premier pallier (ou plus, au besoin)

2. Installation du patient

- Interroger sur
  - Circonstances et heures de l'accident
  - Traumatisme associé
  - Vaccination du tétanos
  - À jeun depuis quelle heure (selon gravité de la plaie)

- Choisir et commencer la distraction avec l'enfant et ses parents (livre, écran, VR, etc.)
- Retirer le pansement de Gel LET en place (si nécessaire)
- Prendre le relais par l'application du Gel LET **au bâtonnet** (non stérile) afin de désensibiliser l'enfant et diminuer son anxiété (si nécessaire)
- **Le nettoyage de la plaie sera effectué une fois que l'anesthésie locale et /ou l'antalgie sera efficace.**
- **Désinfection** de la plaie à la Chlorhexidine aqueuse 0.5% (Sauf oreille, si doute sur la désinfection Chlorhexidine versus Bétadine, demander au médecin)
- **Si changement de désinfectant**, rincer au NaCl 0.9% entre les deux

3. Plaies spécifiques

Morsures *avec perforation de la peau (animales ou humaines)*

- Nettoyer à la bétadine savon
- Rincer au NaCl 0.9%
- Désinfecter à la Bétadine
- Si plaie importante et/ou visage mettre Emla (pour CVP et ATB ou prise en charge au bloc)
- Si signes d'infection clinique : prélèvement bactério avant la désinfection
- Si suspicion atteinte articulaire, tendineuse, cartilagineuse ou osseuse, anticiper une révision de plaie sous AG.
- Se renseigner sur l'animal incriminé (connu ? vaccination ?) (le médecin doit faire une déclaration, même si animal de la famille)
- Morsure de chien : déclaration obligatoire au vétérinaire cantonal (formulaire)

Fractures ouvertes *exposition articulaire ou tendineuse / plaie pavillon de l'oreille*

- Signes ortho (couleur, chaleur, sensibilité, fourmillements), déformation
- Désinfection à la Bétadine (ne pas mettre de compresses bétadinées sur les extrémités pour faire la radio car radio-opaque)
- Emla pour CVP antalgie, ATB et/ou Bloc
- Évaluer la nécessité de l'Emla pour anesthésie en bague
- Garder à jeun
- Anticiper l'hospitalisation

Amputation

- Conserver le bout amputé dans du NaCl 0.9% (pas en contact direct avec la glace)
- Désinfection à la Bétadine
- Si possible mettre Emla
- Anticiper l'hospitalisation

Plaies infectées

- Faire un prélèvement pour bactério avant la désinfection

Autres plaies avec prise en charge spécifique *anticiper prise en charge au bloc (Emla, à jeun, etc.)*

- Embarrure, extériorisation de substance cérébrale ou fuite de liquide céphalo-rachidien
- Plaies des paupières dépassant le plan cutané ou intéressant leur bord libre
- Plaies du périnée
- Plaies profondes des joues, plaies extensives de la langue et de la cavité buccale
- Plaies transfixiantes ou plaie de l'oreille
- Plaies avec perte de substance
- Une plaie du globe oculaire est une urgence ophtalmologique
- Plaies importantes et/ou profonde de la main
- Suspicion de maltraitance