

Respecter le protocole "Pour accueil et installation" et :

1. Installation du patient :

- ☒ **Nettoyage** du sang séché ou coagulé
- ☒ **Désinfection** de la plaie à la Chlorhexidine aqueuse 0.5% (Si doute sur la désinfection Chlorhexidine versus Bétadine, demander au médecin)
- ☒ **Si changement de désinfectant**, rincer au NaCl 0.9% entre les deux
- ☒ **Gel Let à appliquer selon protocole** (si pas déjà mis au tri) (cf. procédure [Tri : Plaies](#))
- ☒ **Anamnèse**
 - Circonstances et heures de l'accident
 - Traumatisme associé
 - Vaccination du tétanos
 - À jeun depuis quelle heure (selon gravité de la plaie)
- ☒ **Colle Dermabond**, l'application se fait par le médecin

2. Plaies spécifiques :

- ☒ **Morsures** avec perforation de la peau (animales ou humaines) :
 - Nettoyer à la bétadine savon
 - Rincer au NaCl 0.9%
 - Désinfecter à la Bétadine
 - Si plaie importante et/ou visage mettre Emla (pour ATB et/ou prise en charge au bloc)
 - Si signes d'infection clinique : prélèvement bactériologique avant la désinfection
 - Si suspicion atteinte articulaire, tendineuse, cartilagineuse ou osseuse, anticiper une révision de plaie sous AG.
 - Se renseigner sur l'animal incriminé (connu ? vaccination ?) (le médecin doit faire une déclaration, même si animal de la famille)
 - Morsure de chien : déclaration obligatoire au vétérinaire cantonal ([formulaire](#))
- ☒ **Fractures ouvertes** / exposition articulaire ou tendineuse / plaie pavillon de l'oreille
 - Signes ortho (couleur, chaleur, sensibilité, fourmillements), déformation
 - Désinfection à la Bétadine (ne pas mettre de compresses bétadinées sur les extrémités pour faire la radio car radio-opaque)
 - Emla pour antalgie, ATB et/ou Bloc
 - Garder à jeun
 - Anticiper l'hospitalisation
- ☒ **Amputation**
 - Conserver le bout amputé dans du NaCl 0.9% (pas en contact direct avec la glace)
 - Désinfection à la Bétadine
 - Si possible mettre Emla
 - Anticiper l'hospitalisation
- ☒ **Plaies infectées**
 - Faire un prélèvement pour bactériologie avant la désinfection
- ☒ **Autres plaies avec prise en charge spécifique** : *anticiper prise en charge au bloc (Emla, à jeun, etc.)*
 - Embarrure, extériorisation de substance cérébrale ou fuite de liquide céphalo-rachidien
 - Plaies des paupières dépassant le plan cutané ou intéressant leur bord libre
 - Plaies du périnée
 - Plaies profondes des joues, plaies extensives de la langue et de la cavité buccale
 - Plaies transfixiantes ou plaie de l'oreille
 - Plaies avec perte de substance
 - Une plaie du globe oculaire est une urgence ophtalmologique
 - Plaies importantes et/ou profonde de la main
 - Suspicion de maltraitance