Rougeole

Cas suspects (à confirmer au tri avec CDC flux 34824)

- enfant **NON vacciné** par ROR (2 doses minimum) AVEC présence des **3 symptômes** suivants :
  - **rash**
  - **fièvre**
  - **conjonctivite ou rhinite ou toux**

- enfant **NON vacciné** par ROR (2 doses minimum) ET **contact avec cas confirmé de rougeole** présentant au moins **l'un** des symptômes suivants :
  - **rash**
  - **fièvre**
  - **conjonctivite ou rhinite ou toux**

Dès le tri

- Mettre au patient (± entourage symptomatique) un **masque ultra-filtrant type FFP2** en permanence (nez et bouche)
- Si possible installer directement dans un box (en pression négative), sinon en salle d'attente isolement COCCINELLE (à côté du LHCD)
- Ne jamais installer au LHCD

Isolement

Suspicion ou cas avéré : isolement **« Air »** et **« Mesures de base »**

Lorsque le patient quitte le SAUP

- Au départ du patient, pas de réadmission d'un autre patient non immun ou dont les accompagnants seraient non immuns contre la rougeole avant **2 heures** de temps; le bio-nettoyage du box peut être réalisé dans ce laps de temps (jusqu'à 22h tel nettoyeur 31 946, après 22h faire le nettoyage du box avec "TRISTEL FUSE"). Si pas possible, fermer le box jusqu'au nettoyage
- Noter sur Synopsis l'heure d'ouverture prévue
- Pas de mesure particulière de nettoyage ou fermeture à prendre pour la salle d'attente
- Si rougeole confirmée, dresser un listing des personnes potentiellement en contact avec le cas de rougeole AVANT mise en place de l'isolement (entourage du patient, autres patients du SAUP et leurs accompagnants, médecins, soignants, administratifs)

Pour plus d'informations :
https://vigigerme.hug-ge.ch/fiche-vigigerme/mv-morbillivirus-paramyxovirus-virus-de-la-rougeole