Tri – Etat fébrile

DFEA, Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques	Responsable du document : Kevin HADDAD	Mise à jour 04.02.2021

Si T° > 38.5 *et* si enfant confortable

- Déshabiller (body, chemisette)
- Demander aux parents de prévenir l'inf du desk si l'enfant devient inconfortable
- Surveiller l'enfant aux 30 min (faire revenir au desk)

Si T° > 38.5 *et* si enfant inconfortable, symptomatique *(apathique, marbré, cyanosé, irritable, tachypnéique, etc.)*

- Déshabiller (body, chemisette) et surveiller aux 30 min
- Si n'a pas reçu de traitement → donner du paracétamol
- Si reçu un traitement < 4h → déshabiller et surveiller aux 30 min
- Si a reçu du paracétamol > 4h → donner de l'ibuprofène / méfénacid
- Si a reçu un AINS > 4h → donner du paracétamol
- Si a des allergies → voir avec CdC ou interne
- Si a moins de 6 mois et a déjà reçu paracétamol → voir avec CdC ou interne
- Autres cas → voir avec CdC ou interne

Paracétamol 15 à 20 mg/kg/dose, max 4 x jours

Dafalgan sirop	15 mg/kg	10 ml = 300 mg

Dafalgan supp	
4 à 7,5 kg	80 mg
7,5 à 15 kg	150 mg
15 à 30 kg	300 mg
> 30 kg	600 mg

Ibuprofène 10 mg/kg/dose, max 40mg /kg/j

Algifor sirop 5ml = 100 mg	
7 à 10 kg	70 mg = 3.5 ml
10 à 15 kg	100 mg = 5 ml
15 à 20 kg	150 mg = 7.5 ml
20 à 35 kg	200 mg = 10 ml ou cp
> 35 kg	400 mg = 20 ml ou cp

Ibuprofen supp	
7 < 15 kg	100 mg
> 15 kg	200 mg

Méfénacid *supp*

6 mois à 25 kg	125 mg