

1. Tri :

☒ Anamnèse

- Circonstances et heures de l'accident
- Traumatisme associé
- Vaccination du tétanos
- À jeun depuis quelle heure (selon gravité de la plaie)

☒ Antalgie selon protocole douleur (attention si TC ou si doit rester à jeun)

☒ Désinfection locale

☒ Gel Let **Indications** ([procédure "Gel-Let"](#))

- Lacérations simples du cuir chevelu et du visage
- Lacérations simples des membres et du tronc
- Plaies inférieures à 6 cm (cave posologie)

Contre-indications

- Plaies des muqueuses
- Plaies inflammatoires ou potentiellement infectées (morsure)
- Suspicion de fractures ouvertes
- Allergie aux amines et/ou esters anesthésiques

2. Tri - Plaies spécifiques :

☒ Morsures

- Si plaie importante et/ou visage mettre Emla

☒ Fractures ouvertes

- Signes ortho (couleur, chaleur, sensibilité, fourmillements), déformation
- Immobilisation
- Si possible mettre Emla pour antalgie, ATB et/ou Bloc
- Garder à jeun

☒ Amputation

- Conserver le bout amputé dans du NaCl 0.9% (pas en contact direct avec la glace)
- Si possible mettre Emla

☒ Plaies infectées

- Évaluer la nécessité de l'Emla

☒ Plaies des lèvres / bouche

- Si suspicion de plaie transfixiante mettre Emla (pour ATB)

☒ Lésions dentaires isolées

- Cf. : [Tri – Dentaire](#)