

INDICATIONS POUR PERSONNEL SOIGNANT



HYGIÈNE POUR L'ENTRETIEN DES PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

BUT

- Eviter l'apparition d'infections des muqueuses buccales, toute pathologie gingivale ainsi qu'une mauvaise haleine.

MATERIEL

- Petite brosse à dents pour nettoyer l'intérieur de prothèse ainsi que les faces des dents en contact avec la langue et les faces des dents en contact avec les lèvres.
- Brosse à dents.
- Compresse.



TECHNIQUE DE NETTOYAGE QUOTIDIENNE

- Remplir l'évier avec de l'eau (pour protéger la prothèse en cas de chute).
- Mettre des gants.
- Nettoyer la prothèse avec la brosse à dents, jusqu'à élimination complète de toute salissure visible (bien mouiller la brosse à dents avec de l'eau et du savon ou du liquide vaisselle).
- Sur la prothèse sèche, contrôler qu'il n'y a plus de tâches blanchâtres.
- Saisir la pointe de la langue entre pouce et index et passer la brosse à dents sur le dos de la langue.
- Essuyer les muqueuses avec une compresse mouillée.

DESINFECTION DE LA PROTHESE

- Remplis un verre avec un mélange de $\frac{1}{2}$ de DAKIN et $\frac{1}{2}$ d'eau.
- Laisser tremper la prothèse pendant 10 minutes, 1x/mois.
- Bien rincer.



QUAND NETTOYER LA PROTHESE

- Rincer la prothèse après chaque repas pour éliminer les restes alimentaires.
- Nettoyer une fois par jour avec la brosse à dents.

CONSERVATION DE LA PROTHESE

- Le soir, après nettoyage de la prothèse, la conserver au sec dans une boîte pour la nuit.
- Rincer la bouche et la prothèse avant la mise en bouche (par exemple, le matin).