	Référentiel institutionnel médico-soignant	Référence : HUG_00000718
	Approbateur : ROULIN Marie-Jose	Version n° 1.1
<h2>Technique clinique de soins de la Dialyse Péritonéale Automatisée ou DPA (technique machine)</h2>		
Processus : Prise en charge du patient	Sous-processus : Prise en charge médico-soignante	Approuvé le 14/11/2022

1. Résumé


La dialyse péritonéale automatisée (DPA) est une méthode de dialyse, qui requiert une machine (cyclor) pour effectuer le traitement de suppléance rénale. Après connexion au cathéter, le cyclor va infuser du dialysat (soluté stérile comprenant un agent osmotique et des électrolytes) puis le drainer après un temps de stase pré-établi, ce qui définit un cycle. Le volume infusé, le temps de stase et le nombre de cycles font l'objet d'une prescription médicale. La membrane péritonéale va agir comme un filtre et permettre ainsi tant l'épuration des toxines urémiques accumulées dans l'organisme, que le maintien d'une volémie adéquate. Ce traitement individualisé s'effectue sur une période habituellement de 8 à 12 h 00, de préférence durant le sommeil de la personne soignée.

2. Cadre de référence

[MB - Hygiène des mains & équipement de protection de personnes | VigiGerme® \(hug.ch\)](#)

3. Définitions (objet et contexte)

La DPA est réalisée par des soignants formés à cette technique : **Atelier DP2** (cf. *Plateforme institutionnelle interne – Espace Carrière*)



P. Lefuel - France Rein – Guide pratique des dialysés

Après avoir équipé le cyclor : disposer les poches de dialysat selon la prescription (cf. PRESCO), et insérer la cassette dans le cyclor ; un amorçage de la machine est alors effectué.

La DPA consiste en une succession de drainages/ stases/infusions, effectuée par le cyclor (et donc de manière automatisée) sur une longue période. Pendant les phases de stase, la personne soignée peut éventuellement se déconnecter

La dialyse péritonéale est destinée aux personnes soignées (adultes ou enfants) en auto-traitement à domicile. **En cas d'hospitalisation, le traitement est pris en charge par les soignants de l'unité de soins**, sous supervision de l'équipe de dialyse.

Technique clinique de soins de la Dialyse Péritonéale Automatisée ou DPA (technique machine)

4. Indications

- Personnes soignées (adultes ou enfants) en insuffisance rénale terminale.
- Syndrome cardio-rénale

5. Contre-indications

a. Absolues :

- Dérivation ventriculo-péritonéale.

b. Relatives à discuter avec la ou le chirurgien :

- Antécédents de chirurgie abdominale majeure (mais possibilités d'adhésiolyse).
- Obésité morbide IMC > 45 kg/m²
- Hernies volumineuses non opérables de la paroi abdominale.
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) active (ex : maladie de Cröhn...)
- Stomies (mais possibilité d'utiliser un cathéter pré-sternal)

6. Précautions / prévention

- Préparation rigoureuse et aseptique du cyclier, **maximum 4 h 00 avant d'initier** le traitement.
- **Asepsie rigoureuse** lors de la connexion et déconnexion au cyclier.

7. Matériel

- Poches de dialysat, selon le schéma thérapeutique (cf. PRESCO)
- Kit de branchement spécifique à chaque cyclier
- Désinfectant pour les mains : Sterillium® ou Hopirub®
- Masques pour la ou le soignant et la personne soignée
- Bouchons et coquilles bétadinées (Baxter)

8. Déroulement

*Protocole filmé de la méthode avec Baxter élaboré par les HUG et la
firme Baxter*



<https://www.nephrohug.ch/2016/06/17/protocole-filme-de-montage-et-branchement-sur-le-cycler-claria/>

Protocole filmé de la méthode avec Fresenius



[Accès au protocole de la méthode avec Fresenius](#)

Technique clinique de soins de la Dialyse Péritonéale Automatisée ou DPA (technique machine)

9. Contrôle et surveillance

- **Aspect du dialysat drainé** (si pas d'évacuation au WC) : limpide et clair
- Noter l'ultrafiltration totale (ultrafiltration totale = volume de dialysat infusé – volume de dialysat drainé), enregistrée sur le cycler
- Poids quotidien ventre vide cf. : *Document institutionnel interne* - Protocole clinique relatif au poids en DP – HUG_000000693
- Surveiller le transit intestinal et prévenir la constipation
- Surveiller l'apparition d'œdèmes
- Selon les cas, contrôle ou autocontrôle de la pression artérielle
- Surveillance accrue de la glycémie chez les personnes diabétiques
- Surveillance de l'orifice du cathéter
- Réfection du pansement cf. *Document institutionnel interne* Technique pansement cathéter de DP au long cours – HUG_000000650

10. Education de la personne soignée

La personne soignée doit connaître les principes de la DP. Une formation de plusieurs jours est enseignée à la personne soignée, par l'équipe de dialyse péritonéale avec évaluation de la compréhension de la méthode, de la maîtrise du cycler et de la gestion des alarmes. Elle est accompagnée à domicile pour son installation.

11. Elimination des déchets

Le liquide effluent est éliminé dans des poches de 15 litres (WC à domicile, vidoir à l'hôpital). Les poches vides sont acheminées dans la filière des ordures ménagères.

12. Références

Fresenius Medical Care
Baxter SA

13. Personnes rédactrices

LEFUEL Pascale, infirmière spécialiste clinique, pôle pratiques professionnelles

14. Personnes relectrices et validatrices

CASSAGNES Brigitte, infirmière spécialisée, service de néphrologie et hypertension
LACROIX Magali, infirmière spécialisée, service de néphrologie et hypertension
JOGUET-RECORDON Anne, infirmière spécialisée, service de néphrologie et hypertension
JOTTERAND DREPPER Valérie, médecin associé, service de néphrologie et hypertension
JANNOU Loïc, infirmier spécialisé, Fresenius
CROCHET Florence, infirmière spécialisée, Baxter SA
Référentiel médico-soignant (RMS)

Cette procédure est placée sous la responsabilité de la Direction des soins et de la Direction médicale et qualité des HUG. Elle s'adresse à tous les professionnels et professionnelles de la santé travaillant aux HUG et, à titre informatif, au public dans un souci de partage de connaissances.

Les HUG déclinent expressément toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou illicite de ce document hors des HUG.